

# 認識茲卡病毒感染症

## Zika virus

- 最早在1947年從烏干達茲卡森林中的獼猴體內分離出來
- 疾病典型症狀持續2-7天：




## 主要流行地區

- 中南美洲、大洋洲、非洲（維德角）、東南亞（泰國、馬爾地夫、菲律賓、越南）
- 即時更新資訊，請參考疾病管制署全球資訊網  
<http://www.cdc.gov.tw>

## 孕婦須知

- 如無必要應暫緩前往流行地區
- 若必須前往請做好防蚊措施  
美國環境保護署已認定孕婦可使用DEET，不會影響孕婦或胎兒
- 離開流行地區後應持續自主健康監測至少二週
- 如有任何疑似症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史
- 若性伴侶去過流行地區請於懷孕期間皆進行安全性行為



## 若感染茲卡病毒 對胎兒有影響嗎？

- 母子垂直感染有可能會導致小頭畸形或死亡
- 不管任何孕期，都需避免感染



## 我懷疑感染茲卡病毒 擔心影響寶寶怎麼辦？

- 就醫通報（醫師診斷）
- 檢驗（抽血確認是否感染）
- 胎兒超音波（檢查小腦畸形或顱內鈣化）
- 定期追蹤（每4週追蹤胎兒超音波）
- 諮詢（免付費1922防疫專線）



# 預防茲卡病毒感染

## 傳染途徑



埃及斑蚊及  
白線斑蚊叮咬傳播



性行為  
傳染



母子垂直感染

其他可能傳染途徑

輸血  
傳染

器官  
移植

實驗室  
傳染

哺乳



避免病媒蚊叮咬



使用衛福部核可  
含DEET防蚊藥劑




清除積水容器



穿著淺色長袖長褲



暫緩捐血



安全性行為

歡樂出遊去   
茲卡別靠近！



疫情通報及諮詢專線：1922   
<http://www.cdc.gov.tw> 105.06



衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC