


99 年男性全死因平均生命損失年數較女性高 0.9 年

99 年 70 歲以下人口潛在生命損失總人年數為 998,555 人年，較上年減少 3.5%，平均生命年數損失為 17.7 年，較上年減少 0.4 年；較 10 年前少損失 2.5 年。

男、女性潛在生命損失總人年數分別為 700,269 人年與 298,286 人年；平均生命年數損失分別為每人 18.0 年與 17.1 年，損失均較上年為低。

歷年全死因平均生命年數損失趨勢圖



事故傷害平均生命損失年數居首

以 99 年十大主要死因平均生命年數損失排序，依序為：(1) 事故傷害 27.7 年；(2) 慢性肝病及肝硬化 18.3 年；(3) 心臟疾病 15.2 年；(4) 惡性腫瘤 14.7 年；(5) 肺炎 14.0 年；(6) 腦血管疾病 13.9 年；(7) 腎炎、腎病症候群及腎病變、高血壓性疾病同為 12.2 年；(9) 糖尿病 11.3 年；(10) 慢性下呼吸道疾病 11.0 年。就男性而言，其排序除第 5、6 對調外，餘均相同。就女性觀察，則有較大的差異，其排序為 (1) 事故傷害；(2) 惡性腫瘤；(3) 肺炎；(4) 心臟疾病；(5) 慢性肝病及肝硬化；(6) 腦血管疾病；(7) 慢性下呼吸道疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變；(9) 高血壓性疾病 (10) 糖尿病。

就平均生命損失年數與上年比較，男性以腎炎、腎病症候群及腎病變較上年減少 1 年，

其減幅最大；女性則以事故傷害及慢性下呼吸道疾病減幅較大，而以高血壓性疾病及腎炎、腎病症候群及腎病變增幅較大，分別增加 1.9 年 1.6 年。

70歲以下國人之十大死因平均生命年數損失


	單位：年								
	99年 (A)			98年 (B)			增減年數 (A-B)		
	計	男	女	計	男	女	全體	男	女
所有死亡原因	17.7	18.0	17.1	18.1	18.4	17.5	-0.4	-0.4	-0.4
惡性腫瘤	14.7	14.6	15.0	14.9	14.8	15.0	-0.2	-0.3	0.0
心臟疾病（高血壓性疾病除外）	15.2	15.6	13.8	15.0	15.6	13.4	0.2	0.0	0.5
腦血管疾病	13.9	14.3	13.1	13.9	14.3	13.0	0.0	-0.1	0.1
肺炎	14.0	13.9	14.4	13.8	13.9	13.6	0.2	0.0	0.8
糖尿病	11.3	12.3	9.6	10.9	11.9	9.4	0.3	0.3	0.2
事故傷害	27.7	28.1	26.3	28.0	28.1	27.7	-0.4	-0.1	-1.4
慢性下呼吸道疾病	11.0	10.8	11.7	11.0	10.5	12.5	0.0	0.2	-0.9
慢性肝病及肝硬化	18.3	19.4	13.2	18.5	19.9	12.6	-0.1	-0.5	0.6
高血壓性疾病	12.2	12.5	11.4	11.9	13.1	9.5	0.2	-0.6	1.9
腎炎、腎病症候群及腎病變	12.2	12.5	11.7	12.2	13.5	10.1	0.0	-1.0	1.6

附註 1：潛在生命年數損失：各年齡預期可活存年數為(70-死亡時之年齡)*該年齡死亡人數之和。

2：平均生命年數損失：潛在生命年數損失/該死因之死亡人數。

癌症生命年數損失 14.7 年，較 98 年男性減 0.3 年、女性持平

歷年惡性腫瘤死因平均生命年數損失趨勢圖



99 年 70 歲以下人口惡性腫瘤潛在生命年數損失總人年數為 303,883 人年，較上年增加 1.0%，平均生命年數損失為 14.7 年，較 98 年減少 0.2 年。長期而言，女性平均生命損失年數

均較男性為高，惟男女性差距有減少趨勢。

70歲以下國人之十大癌症死因平均生命年數損失

單位：年

	99年 (A)			98年 (B)			增減年數 (A-B)		
	計	男	女	計	男	女	全體	男	女
所有癌症死亡原因	14.7	14.6	15.0	14.9	14.8	15.0	-0.2	-0.3	0.0
氣管、支氣管和肺癌	11.8	11.2	12.9	12.3	11.9	12.9	-0.4	-0.7	0.0
肝和肝內膽管癌	13.4	14.1	10.8	13.6	14.4	10.5	-0.2	-0.3	0.3
結腸、直腸和肛門癌	13.6	13.0	14.5	13.6	13.0	14.4	0.1	0.0	0.1
女性乳房癌	16.7	...	16.7	17.0	...	17.0	-0.3	...	-0.3
胃癌	13.7	12.7	15.4	14.3	12.7	16.7	-0.6	0.0	-1.4
口腔癌	16.7	16.8	14.5	17.6	17.6	17.6	-0.9	-0.7	-3.1
前列腺(攝護腺)癌	6.5	6.5	...	7.3	7.3	...	-0.8	-0.8	...
食道癌	15.9	15.9	14.1	15.5	15.7	12.3	0.4	...	1.9
胰臟癌	12.0	12.4	11.5	11.9	12.4	11.3	0.1	0.0	0.2
子宮頸及部位未明示子宮癌	16.7	-	16.7	16.1	-	16.1	0.6	...	0.6

附註 1：潛在生命年數損失：各年齡預期可活存年數為(70-死亡時之年齡)*該年齡死亡人數之和。

2：平均生命年數損失：潛在生命年數損失/該死因之死亡人數。

以男性平均每死亡者生命年數損失來看，則以口腔癌 16.8 年居首，其餘依序為食道癌 15.9 年、肝癌 14.1 年、結腸、直腸和肛門癌 13.0 年、胃癌 12.7 年、胰臟癌 12.4 年、肺癌 11.2 年與攝護腺癌 6.5 年。若以 98 年比較，各癌別其平均生命年數較上年減少損失或者持平，其中以攝護腺癌減少 0.8 年最多。

另以女性平均每死亡者生命年數損失來看，則以子宮頸癌及女性乳癌 16.7 年居首，其餘依序為胃癌 15.4 年、結腸、直腸和肛門癌與口腔癌 14.5 年、食道癌 14.1 年、肺癌 12.9 年、胰臟癌 11.5 年、肝癌 10.8 年。若以 98 年比較，除口腔癌、胃癌、女性乳癌其平均生命年數較上年減少損失外，其餘均為增加，其中以食道癌增加 1.9 年最多。

