



世界衛生組織認證之愛兒肺平-3及兒立服-2



加強期(Intensive Phase)

持續期(Continuation Phase)


愛兒肺平-3

RHZ 75/50/150 mg

兒立服-2

RH 75/50 mg

兒童體重
(kg)



使用錠數

4-7

1

1

8-11

2

2

12-15

3

3

16-24

4

4

25以上

請參考成人劑量開立處方

使用方式：將所需藥品錠數投入飲水中，待完全溶解後，即可服用。

申請辦法

- 1.申請原因：
體重未滿25kg之「兒童結核病人」及「BCG不良反應者」。
- 2.申請對象：
所有醫療院所。
- 3.申請流程：
請參照疾管署專業版網頁→結核病專區→治療照護→抗結核免費藥品申請流程辦理。(請洽醫院的TB 個管師/感染控制)



使用注意事項

1. 本藥品為專案進口抗結核免費藥，使用前須請病人或其監護人簽署同意書(請參照疾管署專業版網頁→結核病專區→治療照護→抗結核免費藥品申請→抗結核免費藥(專案進口)病患同意書)。
2. 由於愛兒肺平-3及兒立服-2尚未取得我國藥證，故不符合申請藥害救濟的範圍；若發現病人出現不良反應，請立即通知全國藥物不良反應通報中心或撥打1922，以保障病人權益。