

馬兜鈴


【來源】馬兜鈴科 (Aristolochiaceae) 植物北馬兜鈴 (*Aristolochia contorta* BUNGE)

【形態】多年生攀援或匍匐草本，有香氣，根圓柱形，外皮黃褐色。長 1m 餘。葉互生，三角狀心形至矩圓形或卵形至卵狀披針形，長 3~8 cm，頂端短漸尖或鈍，基部小形，兩側具圓耳片，基出脈 5~7 條，下面略帶灰白色；葉柄長 1~2 cm。花單生或 3~10 朵簇生於葉腋，暗紫綠色，喇叭狀，長 3~4 cm，基部膨大如珠，中部收縮，上端逐漸擴大成向一面偏的側片；側片卵狀披針形，頂端漸尖；雄蕊 6，貼生於肉質花柱上，幾無花絲；柱頭 6，子房下位。蒴果，倒廣卵形或橢圓狀倒卵形，下垂。表面黃綠色或灰棕色，有波狀彎曲的縱稜及平直的縱紋各 6 條，二者間隔排列，由背縫線分出多數橫脈紋；6 瓣裂；果梗，長 3~5 cm。種子三角形，扁平有翅，平疊排列於各果瓣內。花期 7~8 月，果期 9 月。

【藥材】北馬兜鈴之果實。蒴果球形或長圓形，基部鈍圓，長 2~5.5 cm，直徑 2.3~3 cm，果柄長 2.5~4 cm，背縫線縱稜較平直；種子上端寬約 1.3 cm。果實沿腹縫線自下向上開裂成 5 果瓣，果柄亦分裂成 6 條，氣微，味淡。



北馬兜鈴 (*Aristolochia contorta* BUNGE)



市售北馬兜鈴藥材

市售馬兜鈴藥材

偽品：台灣百合

【來源】百合科(Liliaceae)植物台灣百合(*Lilium formosanum* WALL.)

【形態】多年生宿根性草本。株高 30~120 cm，莖綠色，常具紫紅色斑點。葉互生，無柄，葉片帶狀線形，長 8~25 cm，寬 5~12 mm，先端漸尖形，全緣。花頂生單 1 或多朵側生，並下彎側向開放。鱗莖球形或廣橢圓形，徑 3~5 cm，白色、棕黃色或黃紅色。花冠狹漏斗狀，有芳香，表面白色被紫紅色或斑條、斑點，花被片 6 枚，倒卵狀披針形或倒披針形，微反卷。雄蕊 6 枚，較花被短。子房短柱形，柱頭 3 痕裂。蒴果柱形，3 鈍稜，熟後由頂端室裂，種子多數，扁平，淡黃褐色，周圍具薄翅。花期春、夏間。果期夏、秋間。

【藥材】台灣百合之種子。蒴果柱形，三鈍稜，熟後由頂端室裂，種子多數，扁平，淡黃褐色，周圍具薄翅。



台灣百合 (*Lilium formosanum* WALL.)



市售藥材

※ 資料來源：

「台灣市售中藥材真偽及代用品圖集」行政院衛生署中醫藥委員會出版

※ 如欲購買本圖集，請至以下政府出版品展售門市：

三民書局：臺北市重慶南路一段 61 號 2 樓 TEL：02-23617511

國家書坊台視總店：台北市八德路三段十號 TEL：02-25781515 轉 643

五南文化廣場：臺中市中山路 2 號 B1 TEL：04-2258234

新進圖書廣場：彰化市光復路 177 號 TEL：04-7225891

青年書局：高雄市青年一路 141 號 3 樓 TEL：07-3331829