

110 年死因統計結果分析

依世界衛生組織（WHO）疾病分類（ICD-10）及死因選取準則，採導致死亡的起始病因為分類基準，完成我國死因統計。

2016 年版 ICD-10 大幅修訂死因選取準則，主要修訂方向有下列 3 項：一為不選症狀徵候及不明確編碼（俗稱垃圾碼），二隨公衛醫學進步及疾病型態多元，疾病間因果關係或有更迭，依最新實證醫學修訂疾病間因果關係，三隨人類壽命愈趨高齡，年長者呼吸衰竭、心臟停止等死因允許可選取衰老或老邁作為死因。

108 年起我國死因統計改依「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」，在選取準則不同基礎下，為剔除不同準則版本因素，以利純疾病因素前後時間資料比較，故將 107 年死亡資料重新依「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」計算，兩者(新舊)比值稱「轉換比值」。並依「轉換比值」回推 97-106 年死因資料，稱「經轉換比值調整後值」，與原發布數做一區隔，本文分析中，107 年以前之各年比較資料均為「經轉換比值調整後值」。以下分別就死亡人數變化概況、主要死因分析加以說明。


壹、死亡人數變化概況

一、110 年標準化死亡率較 109 年上升 3.8%

110 年國人死亡人數計 18 萬 4,172 人，較上（109）年上升 6.4%（或增 1 萬 1,105 人），死亡率（死亡人數除以年中人口數）為每十萬人口 784.8 人，上升 6.9%，受人口老化影響（65 歲以上增 1 萬 280 人；80 歲以上增 6,215 人），及 110 年 1 月有 3 分之 1 日子為低溫（增 1,808 人）影響，致 110 年死亡人數較上年增加萬餘人；另受 COVID-19 疫情影響死亡為 896 人（包含國人國外死亡 57 人）。若以 WHO 西元 2000 年世界標準人口年齡結構計算之標準化死亡率為每十萬人口 405.5 人，上升 3.8%。

就長期變化趨勢觀察，隨人口成長及高齡人口比重增加，死亡人數呈上升趨勢，近 10 年死亡人數平均年增 1.9%，死亡率平均年升 1.8%，標準化死亡率則平均年降 1.3%。

圖 1 歷年兩性死亡人數及死亡率



二、男、女性死亡人數分別升 5.6%、7.6%

110 年男性死亡人數 10 萬 7,064 人，較上年上升 5.6%，女性 7 萬 7,108 人，升 7.6%，男性死亡人數約為女性之 1.4 倍，與上年差距相同。


男性標準化死亡率為每十萬人口 530.1 人，較上年上升 3.8%，較 100 年下降 10.2%；女性標準化死亡率為每十萬人口 295.4 人，較上年上升 3.9%，較 100 年下降 13.3%，男性為女性的 1.8 倍。

三、65 歲以上死亡數占 74.5%

受人口結構快速高齡化影響，65 歲以上死亡者占總死亡人數比率呈現逐年遞增趨勢，110 年 65 歲以上死亡人數 13 萬 7,161 人，較上年升 8.1%（或增 1 萬 280 人）；占總死亡人數比重達 74.5%，較上年增 1.2 個百分點，較 100 年增 5.9 個百分點。

110 年 65 歲以上死亡人口中，65-74 歲者占全部死亡人數 19.3%，較 100 年增 2.3 個百分點，75-84 歲者占 24.5%，較 100 年減 5.0 個百分點，85 歲以上者占 30.7%，則較 100 年上升 8.7 個百分點，顯示 65 歲以上死亡人數占比提高，主要係因 85 歲以上死亡人數快速增加所致。

圖 2 歷年死亡人數年齡結構



貳、主要死因分析

死因統計與分析有助於公共衛生政策之規劃與全民健康之提升，以下先概述 110 年國內十大死因，次就居十大死因首位之癌症，以及事故傷害與自殺死亡等各界較關注之死因進一步說明，最後分析年齡別主要死因差異。

一、十大死因

(一) 惡性腫瘤（癌症）續居十大死因首位

110 年十大死因，依序為每十萬人口中（1）癌症死亡 220.1 人（2）心臟疾病 93.1 人（3）肺炎 57.7 人（4）腦血管疾病 51.9 人（5）糖尿病 48.8 人（6）高血壓性疾病 33.6 人（7）事故傷害 28.9 人（8）慢性下呼吸道疾病 26.6 人（9）腎炎、腎病症候群及腎病變 23.3 人（10）慢性肝病及肝硬化 17.3 人；十大死因合計死亡人數 14 萬 1,123

人，占總死亡人數之 76.6%，以慢性疾病為主。癌症自 71 年起已連續 40 年居國人死因首位。


表 1 十大死因死亡人數及死亡率

順位	所有死亡原因	死亡人數(人)		死亡率(每十萬人口)			標準化死亡率(每十萬人口)		
		110年	較上年增減%	109年順位	110年	較上年增減%	順位	110年	較上年增減%
		184,172	6.4		784.8	6.9		405.5	3.8
1	癌症	51,656	3.0	1	220.1	3.5	1	118.2	0.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21,852	6.8	2	93.1	7.3	2	45.6	4.3
3	肺炎	13,549	-1.4	3	57.7	-0.9	3	25.3	-4.0
4	腦血管疾病	12,182	3.1	4	51.9	3.6	4	25.2	-0.3
5	糖尿病	11,450	11.0	5	48.8	11.6	5	23.8	8.1
6	高血壓性疾病	7,886	17.6	7	33.6	18.2	7	15.2	13.2
7	事故傷害	6,775	0.1	6	28.9	0.6	6	20.0	-1.4
8	慢性下呼吸道疾病	6,238	10.3	8	26.6	10.8	8	11.7	6.1
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,470	7.3	9	23.3	7.9	10	10.9	4.2
10	慢性肝病及肝硬化	4,065	2.5	10	17.3	3.0	11	10.4	0.6

(二) 110 年前十大死因同 109 年

110 年前十大死因同 109 年，惟高血壓性疾病與事故傷害相較 109 年排序對調，分別為第 6 名及第 7 名。若與 100 年相較，癌症及心臟疾病均居前 2 位；另順位上升者有肺炎、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變；順位下降者有腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化。

圖 3 十大死因死亡率-110 年 vs. 100 年



說明：100 年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。


(三) 十大死因按性別排序

觀察兩性十大死因，110年男性死亡率均高於女性，其中又以慢性肝病及肝硬化男性死亡率為女性2.6倍（每十萬人口25.1人／9.7人），慢性下呼吸道疾病為2.4倍（37.7人／15.7人），事故傷害為2.3倍（40.6人／17.4人），差異較明顯。

就性別主要死因觀察，男性110年十大死因依序為每十萬人口中（1）癌症死亡267.7人（2）心臟疾病108.7人（3）肺炎69.3人（4）腦血管疾病60.9人（5）糖尿病49.7人（6）事故傷害40.6人（7）慢性下呼吸道疾病37.7人（8）高血壓性疾病34.4人（9）慢性肝病及肝硬化25.1人（10）腎炎、腎病症候群及腎病變23.7人，與上年相較，死因順位均相同。

女性110年十大死因依序為每十萬人口中（1）癌症死亡173.4人（2）心臟疾病77.8人（3）糖尿病47.9人（4）肺炎46.4人（5）腦血管疾病43.1人（6）高血壓性疾病32.8人（7）腎炎、腎病症候群及腎病變23.0人（8）事故傷害17.4人（9）慢性下呼吸道疾病15.7人（10）血管性及未明示之失智症15.2人，與上年相較，原順位第3的肺炎與第4的糖尿病順位對調，原順位第9的血管性及未明示之失智症與第10的慢性下呼吸道疾病順位對調，其餘與上年順位相同。

圖 4 110年兩性十大死因死亡率



(四) 死亡年齡中位數 77 歲

110年死亡者之年齡中位數為77歲，男性73歲，女性81歲，均與109年相當。十大死因中，心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變等7類死因死亡年齡中位數均高於所有死因之77歲。事故傷害、慢性肝病及肝硬化死亡年齡中位數僅64歲和61歲，且男性低於女性之歲數分別為9歲及18歲。

表 2 十大死因死亡年齡中位數

單位：歲


順位	死亡原因	110年			較109年增減歲數		
		合計	男	女	合計	男	女
	所有死因	77	73	81	-	-	-
1	癌症	70	69	72	-	-	1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	80	74	84	-	-	-
3	肺炎	85	83	86	-	-1	-
4	腦血管疾病	80	76	83	1	-	-
5	糖尿病	79	74	82	-	-	1
6	高血壓性疾病	84	79	87	1	1	1
7	事故傷害	64	61	70	-	-	1
8	慢性下呼吸道疾病	84	84	86	-	-	1
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	81	79	83	-	-	-
10	慢性肝病及肝硬化	61	57	75	-	1	-

二、癌症

(一) 長期觀察，癌症標準化死亡率呈下降趨勢

110年國人癌症死亡人數為5萬1,656人(男性3萬1,121人,女性2萬535人),占總死亡人數之28.0%,較上年上升3.0%(或增1,495人),近10年平均年增率為1.8%。

圖 5 歷年兩性癌症死亡人數及死亡率




說明：100-107年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。

110年癌症死亡率為每十萬人口220.1人,較上年上升3.5%,近10年平均年增率為1.7%;標準化死亡率為每十萬人口118.2人,較上年上升0.7%,近10年標準化死亡率平均年降1.2%。

65歲以上癌症死亡人數為3萬3,919人,較上年上升4.7%,較100年上升32.0%;0-64歲癌症死亡1萬7,737人,較上年下降0.2%,較100年增2.3%,低於65歲以上增幅,致65歲以上癌症死亡數占比呈上升趨勢。

圖 6 歷年癌症死亡人數




說明：100-107年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。

(二) 十大癌症順位

依死亡率排序，110年十大癌症死因依序為每十萬人口中(1) 氣管、支氣管和肺癌死亡42.8人(2) 肝和肝內膽管癌34.0人(3) 結腸、直腸和肛門癌28.4人(4) 女性乳癌24.6人(5) 前列腺(攝護腺)癌14.5人(6) 口腔癌14.5人(7) 胰臟癌11.3人(8) 胃癌9.8人(9) 食道癌8.6人(10) 卵巢癌5.9人。與100年比較，順位上升者有前列腺癌、胰臟癌與卵巢癌，順位下降者有口腔癌、胃癌、子宮頸及部位未明示子宮癌。


圖 7 十大癌症死因死亡率-110年 vs. 100年



說明：100年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。


就近 10 年順位上升之癌症死因觀察，110 年前列腺癌死亡人數 1,689 人，較上年下降 2.4%，死亡率每十萬人口 14.5 人，亦較上年下降 1.8%；若與 100 年比較，前列腺癌死亡人數及死亡率分別上升 46.0%及 46.1%，順位由第 7 位上升至第 5 位。

圖 7-1 近年前列腺(攝護腺)癌死亡概況




110 年胰臟癌死亡人數 2,659 人，較上年上升 8.5%，死亡率為每十萬人口 11.3 人，亦較上年上升 9.1%；若與 100 年比較，胰臟癌死亡人數及死亡率分別上升 62.7%及 60.8%，順位由第 8 位上升至第 7 位。

圖 7-2 近年胰臟癌死亡概況



110年卵巢癌死亡人數696人，較上年下降3.9%，死亡率每十萬人口5.9人，亦較上年下降3.5%；若與100年比較，卵巢癌死亡人數及死亡率分別上升51.6%及47.8%，順位由第12位上升至第10位。


圖 7-3 近年卵巢癌死亡概況



(三) 十大癌症按性別分

前十大癌症死因以性別觀察，男、女性之第一大癌症死因均為肺癌，男性第2與第3順位癌症死因為肝癌與結腸直腸癌，女性則為乳癌與結腸直腸癌，十大癌症死因中男、女性死亡率差距較大者為口腔癌。

圖 8 110年兩性十大癌症死因死亡率



(四) 癌症死亡年齡中位數 70 歲

110 年癌症死亡者之年齡中位數為 70 歲，男性 69 歲，女性 72 歲，女性較上年增加 1 歲，男性則相同。十大癌症死因中，女性乳癌、口腔癌、食道癌與卵巢癌之死亡年齡中位數低於所有癌症死亡年齡中位數，其中口腔癌與食道癌皆僅 61 歲。

表 3 十大癌症死亡年齡中位數

單位：歲

順位	死亡原因	110年			較109年增減歲數		
		合計	男	女	合計	男	女
	癌症	70	69	72	-	-	1
1	氣管、支氣管和肺癌	72	71	73	1	-	1
2	肝和肝內膽管癌	71	69	77	-	1	1
3	結腸、直腸和肛門癌	73	71	76	-	-	1
4	女性乳癌	63	...	63	1	...	1
5	前列腺(攝護腺)癌	82	82	...	-	-	...
6	口腔癌	61	61	71	-	1	-
7	胰臟癌	70	68	73	-	-1	1
8	胃癌	73	73	74	-	-	-1
9	食道癌	61	61	68	-	-	3
10	卵巢癌	63	...	63	2	...	2

三、事故傷害

(一) 110 年事故傷害死亡人數較 10 年前增 49 人 (或 0.7%)

事故傷害係指非蓄意性傷害事件，如「運輸事故」、「因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒」、「跌倒(落)」、「暴露於煙霧、火災與火焰」、「意外溺死或淹沒」等。110 年事故傷害死亡人數為 6,775 人，居國人死因第 7 位。就事故傷害各死因死亡人數觀察，110 年運輸事故死亡 3,032 人，占 44.8%；跌倒(落)致死 1,482 人，占 21.9%；因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒者 482 人，占 7.1%；意外溺死或淹沒者 291 人，占 4.3%；暴露於煙霧、火災與火焰者 165 人，占 2.4%。

110 年事故傷害死亡數較上年增加 8 人，其中「因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒」、「暴露於煙霧、火災與火焰」均增加 52 人 (含高雄重大建築物火災死亡 40 餘人)；「運輸事故」、「意外溺死或淹沒」、「跌倒(落)」則分別減少 85 人、38 人、2 人。

與 100 年比較，運輸事故死亡者減少 672 人，主要係機動車交通事故死亡人數大幅減少 847 人所致；「意外溺死或淹沒」減少 53 人；「因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒」、「跌倒(落)」、「暴露於煙霧、火災與火焰」分別增加 240 人、362 人及 60 人。

表 4 歷年事故傷害死亡原因結構


單位：人

	事故傷害	運輸事故		因暴露與接觸 有毒物質所致 的意外中毒	跌倒(落)	暴露於煙 霧、火災 與火焰	意外溺死或 淹沒	其他
		運輸事故	機動車事故					
100年	6,726	3,704	3,470	242	1,120	105	344	1,211
101年	6,873	3,497	3,291	325	1,270	133	413	1,235
102年	6,619	3,314	3,129	343	1,318	88	359	1,197
103年	7,118	3,428	3,135	464	1,453	121	327	1,325
104年	7,033	3,204	2,922	570	1,384	119	370	1,386
105年	7,206	3,245	2,964	544	1,541	128	368	1,380
106年	6,965	3,242	3,005	560	1,499	115	342	1,207
107年	6,846	3,209	2,911	519	1,409	119	326	1,264
108年	6,640	3,082	2,814	450	1,487	92	302	1,227
109年	6,767	3,117	2,776	430	1,484	113	329	1,294
110年	6,775	3,032	2,623	482	1,482	165	291	1,323
110年死亡 人數結構比	100.0%	44.8%	38.7%	7.1%	21.9%	2.4%	4.3%	19.5%

(二) 男性事故傷害死亡人數較上年減 26 人，女性則增 34 人

110 年國人事故傷害死亡男性 4,717 人 (占 69.6%)，較 109 年減 26 人；女性 2,058 人 (占 30.4%)，增 34 人。


圖 9 歷年兩性事故傷害死亡人數及死亡率



(三) 事故傷害各年齡層死亡率均較 10 年前下降至少 11%

若就 0-24 歲、25-44 歲、45-64 歲及 65 歲以上等年齡層觀察，110 年 45-64 歲事故傷害死亡人數較上年增加 71 人 (或 3.9%)，65 歲以上較上年增加 1 人，45 歲以下則減少 64 人，其中以 0-24 歲減少 56 人 (或 8.7%) 最為明顯。110 年各年齡層事故傷害死亡率，以 65 歲以上者之每十萬人口 84.6 人最高，最低為 0-24 歲者之每十萬人口 10.6 人；若與 100 年相較，各年齡層死亡率均呈下降。

圖 10 歷年事故傷害年齡別死亡人數及死亡率



四、蓄意自我傷害（自殺）


（一）110 年自殺死亡人數較上年減少 71 人（或 1.9%）

110 年自殺死亡人數為 3,585 人，較上年減少 71 人（或 1.9%），居國人主要死因之第 11 位，和上年相同順位；死亡率為每十萬人口 15.3 人，與上年相較下降 1.5%，110 年自殺人數及死亡率下降至 104 年水準，顯示去年國內疫情並未增加自殺風險。

（二）男性自殺死亡人數高於女性

110 年自殺人數中男性 2,330 人（占 65.0%），較上年減 74 人（或 3.1%），居男性死因第 11 位；女性 1,255 人（占 35.0%），較上年增 3 人，為女性死因之第 12 位；男性自殺死亡率為每十萬人口 20.0 人，約為女性 10.6 人的 1.9 倍。

圖 11 歷年兩性蓄意自我傷害（自殺）死亡人數及死亡率




（三）25 至 64 歲自殺死亡率持續下降

110 年 65 歲以上自殺死亡人數 1,065 人（占 29.7%），較上年增 80 人；0-24 歲 261 人（占 7.3%），較上年增 1 人；25-44 歲 1,019 人，45-64 歲 1,240 人，則分別減 49 人及 103 人。

110 年各年齡層自殺死亡率，65 歲以上死亡率為每十萬人口 27.6 人，45-64 歲為每十萬人口 17.5 人，25-44 歲為每十萬人口 14.5 人，0-24 歲為每十萬人口 4.7 人。與上年比較，0-24 歲上升 3.7%；25-44 歲下降 3.3%，45-64 歲下降 7.7%，65 歲以上上升 3.5%。

圖 12 歷年蓄意自我傷害（自殺）年齡別死亡人數及死亡率



五、110 年年齡別主要死因

就不同年齡層觀察事故傷害死因排名，1-14 歲及 15-24 歲居首位，25-44 歲居第 3 位，0 歲及 45-64 歲均居第 4 位；另 15-24 歲及 25-44 歲死亡人口中，自殺均居死因第 2 位。

25-44 歲、45-64 歲及 65 歲以上死亡人口均以癌症為死因首位；25-44 歲及 45-64 歲中，慢性肝病及肝硬化均居第 5 位死因；65 歲以上死亡人口之前 5 大死因與全國之死因相同，繼癌症之後，第 2 至第 5 位死因分別為心臟疾病、肺炎、腦血管疾病及糖尿病。

表 5 110 年年齡別五大死因

年齡總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65歲以上		
順位	死亡原因	死亡率	死亡原因	死亡率 (每十萬活產)	死亡原因	死亡率	死亡原因	死亡率	死亡原因	死亡率	死亡原因	死亡率	死亡原因	死亡率
	所有死亡原因	784.8	所有死亡原因	412.1	所有死亡原因	12.2	所有死亡原因	43.9	所有死亡原因	105.6	所有死亡原因	529.8	所有死亡原因	3,550.5
1	癌症	220.1	先天性畸形、變形及染色體異常	83.4	事故傷害	2.7	事故傷害	18.5	癌症	26.1	癌症	222.4	癌症	878.0
2	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	93.1	源於周產期的呼吸性疾患	59.2	癌症	2.3	蓄意自我傷害 (自殺)	9.6	蓄意自我傷害 (自殺)	14.5	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	58.2	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	438.8
3	肺炎	57.7	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	40.1	先天性畸形變形及染色體異常	0.9	癌症	4.0	事故傷害	14.4	腦血管疾病	28.5	肺炎	321.4
4	腦血管疾病	51.9	事故傷害	21.7	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	0.7	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	1.8	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	10.0	事故傷害	27.0	腦血管疾病	254.6
5	糖尿病	48.8	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	17.8	加害 (他殺)	0.7	加害 (他殺)	0.7	慢性肝病及肝硬化	7.1	慢性肝病及肝硬化	26.1	糖尿病	243.8


以下將進一步就兒少（0-17 歲）及高齡（65 歲以上）人口死亡率之變化趨勢加以說明。

（一）就長期趨勢觀察，兒少死亡人數及死亡率呈下降趨勢

110 年 18 歲以下之兒少死亡人數 1,161 人，較上年增加 75 人（或 6.9%），較 100 年 1,664 人減少 503 人（或 30.2%），以死亡人數除以該年齡層人口數計算，兒少死亡率為每十萬人口 32.5 人，較上年增 2.9 人，但較 10 年前減少 4.2 人。

就兩性兒少死亡人數及死亡率觀察，男性均高於女性，110 年男性死亡人數 664 人（較 100 年減 290 人或降 30.4%），死亡率為每十萬人口 35.8 人（每十萬人口減 4.6 人），女性死亡人數 497 人（減 213 人或降 30.0%），死亡率 29.0 人（每十萬人口減 3.7 人）。


圖 13 歷年兩性兒少死亡人數及死亡率



若分別就兒童（0-11 歲）與少年（12-17 歲）來看，110 年兒童死亡人數 890 人，占兒少死亡人數之 76.7%，少年 271 人，占 23.3%。與 100 年比較，少年死亡人數降 32.6%（或減 131 人），兒童降 29.5%（減 372 人）。

110 年兒童死亡人數中有 647 人為嬰兒（未滿 1 歲，其中未滿 4 週之新生兒 425 人），較上年增 61 人，占兒童死亡之 72.7%。110 年兒童死亡率為每十萬人口 38.3 人，少年為 21.8 人，每十萬人口分別較 100 年減 9.0 人及增 0.2 人。

圖14 歷年兒童及少年死亡人數及死亡率



110年兒少前五大死因依序為(1)源於周產期的特定病況(2)事故傷害(3)先天性畸形變形及染色體異常(4)癌症(5)心臟疾病(高血壓性疾病除外),合占兒少死亡人數之70.7%。

110年兒童前五大死因合占死亡人數之75.5%,依序為(1)源於周產期的特定病況(2)先天性畸形變形及染色體異常(3)事故傷害(4)癌症(5)嬰兒猝死症候群(SIDS)。

110年少年死因以事故傷害占35.1%,癌症及自殺均占12.9%為主,三者合占少年死亡人數之60.9%。前五大死因依序為(1)事故傷害(2)癌症及蓄意自我傷害(自殺)並列第2位(4)心臟疾病(高血壓性疾病除外)(5)先天性畸形變形及染色體異常。

110年前五大死因排名與上年比較,兒少之心臟疾病(高血壓性疾病除外)由第6升至第5位,兒童之嬰兒猝死症候群(SIDS)由第6升至第5位,少年之癌症由第3升至第2位。

表6 110年兒少主要死亡原因

單位：人

順位	18歲以下兒少			12歲以下兒童			12-17歲少年		
	死亡原因	死亡人數	109順位	死亡原因	死亡人數	109順位	死亡原因	死亡人數	109順位
	所有死亡原因	1,161		所有死亡原因	890		所有死亡原因	271	
1	源於周產期的特定病況	351	1	源於周產期的特定病況	351	1	事故傷害	95	1
2	事故傷害	185	2	先天性畸形變形及染色體異常	152	2	癌症	35	3
3	先天性畸形變形及染色體異常	160	3	事故傷害	90	3	蓄意自我傷害(自殺)	35	2
4	癌症	86	4	癌症	51	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	4
5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	39	6	嬰兒猝死症候群(SIDS)	28	6	先天性畸形變形及染色體異常	8	5

(二) 65 歲以上者死因以癌症居首，心臟疾病居次

110 年 65 歲以上死亡數為 13 萬 7,161 人，占總死亡數之 74.5%，較上年增加 1.2 個百分點，死亡率為每十萬人口 3,550.5 人，較上年增加 3.5%；與 100 年比較，死亡率則下降 14.5%。

以死因觀察，越高齡者糖尿病、事故傷害排序有下降趨勢，肺炎、高血壓性疾病排序則趨上升。

表 7 110 年 65 歲以上人口主要死亡原因


單位：人、每十萬人口

順位	65-74歲			75-84歲			85歲以上		
	死亡原因	死亡人數	死亡率	死亡原因	死亡人數	死亡率	死亡原因	死亡人數	死亡率
	所有死亡原因	35,615	1,472.7	所有死亡原因	45,178	4,365.3	所有死亡原因	56,368	13,750.6
1	癌症	13,809	571.0	癌症	12,233	1,182.0	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	7,918	1,931.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3,740	154.7	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	5,293	511.4	癌症	7,877	1,921.5
3	糖尿病	2,524	104.4	肺炎	3,763	363.6	肺炎	6,913	1,686.4
4	腦血管疾病	2,329	96.3	糖尿病	3,538	341.9	腦血管疾病	4,108	1,002.1
5	肺炎	1,739	71.9	腦血管疾病	3,398	328.3	高血壓性疾病	3,759	917.0
6	事故傷害	1,221	50.5	高血壓性疾病	1,879	181.6	糖尿病	3,355	818.4
7	高血壓性疾病	1,111	45.9	慢性下呼吸道疾病	1,869	180.6	慢性下呼吸道疾病	3,072	749.4
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	982	40.6	腎炎、腎病症候群及腎病變	1,655	159.9	血管性及未明示之失智症	2,199	536.4
9	慢性下呼吸道疾病	862	35.6	事故傷害	1,175	113.5	衰老/老邁	2,167	528.6
10	慢性肝病及肝硬化	706	29.2	血管性及未明示之失智症	768	74.2	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,036	496.7

若以 65 歲以上人口之前 3 大主要死因死亡率 10 年變動觀之，癌症每十萬人口死亡率較 100 年減 14.3%，心臟疾病及肺炎死亡率則分別較 100 年減 4.1%、6.7%。


再就 65 歲以上人口之年齡別死亡率 10 年變動觀察，65-74 歲及 75-84 歲每十萬人口死亡率分別較 100 年下降 20.8%、15.7%，85 歲以上則上升 3.2%。

圖 15 歷年 65 歲以上前三大主要死因死亡率



說明：100-107 年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。

圖 16 歷年 65 歲以上死亡率-按年齡別



參、轉換比值

108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者(新舊)比值稱「轉換比值」。因選取準則不同，為剔除不同準則版本因素，以利純疾病因素前後時間資料比較，歷年資料需經轉換後始得與108-110年比較，附表陳示常用死因之近10年資料，並將「原發布數」乘上「轉換比值」回推歷年資料，呈現相同基礎下之變動情形，回推資料稱之為「經轉換比值調整後值」。

另，死因統計分類繁複，如性別、年齡別、月份別、縣市別、以及兩兩交叉分類等，若就每個複分類均做轉換比值，除過程繁複不利使用者運用，且部分類別數值過小，易因數字微幅變動致轉換比值倍增或減半等，故僅陳示「全國」主要死因及主要癌症之「性別」轉換比值，若使用者有年齡別、縣市別等歷史資料比較需求，可逕使用「全國」轉換比值回推資料，惟選取標準隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

參考附表

附表 1 歷年主要死亡原因

附表 2 歷年男性主要死亡原因

附表 3 歷年女性主要死亡原因

附表 4 歷年主要癌症死亡原因

附表 5 歷年男性主要癌症死亡原因

附表 6 歷年女性主要癌症死亡原因

附表1 歷年主要死亡原因

單位：人、每十萬人口

年 別	所有死亡原因			惡性腫瘤			心臟疾病 (高血壓性疾病除外)			肺炎			腦血管疾病			糖尿病			高血壓性疾病		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	142,283	618.7	484.3	39,345	171.1	135.1	14,317	62.3	47.4	9,165	39.9	29.1	11,540	50.2	37.8	8,412	36.6	28.2	3,551	15.4	11.5
民國98年	142,240	616.3	466.7	40,361	174.9	133.9	13,742	59.5	43.7	8,844	38.3	26.7	11,237	48.7	35.5	8,615	37.3	27.9	3,768	16.3	11.7
民國99年	144,709	625.3	455.6	41,502	179.3	132.9	14,271	61.7	43.4	9,427	40.7	27.1	10,967	47.4	33.1	8,596	37.1	26.5	4,227	18.3	12.5
民國100年	152,030	655.5	462.4	43,032	185.5	133.6	15,034	64.8	43.9	9,573	41.3	26.2	11,713	50.5	33.9	9,506	41.0	28.2	4,690	20.2	13.2
民國101年	153,823	661.0	450.6	44,150	189.7	132.7	15,587	67.0	43.9	9,856	42.4	25.7	11,970	51.4	33.3	9,716	41.8	27.8	5,049	21.7	13.6
民國102年	154,374	661.3	435.3	45,289	194.0	131.8	16,109	69.0	43.7	9,568	41.0	23.7	12,243	52.4	32.7	9,880	42.3	27.1	5,097	21.8	13.1
民國103年	162,886	696.0	443.5	46,605	199.1	131.5	17,661	75.5	46.0	10,955	46.8	26.1	12,698	54.3	32.8	10,307	44.0	27.3	5,528	23.6	13.7
民國104年	163,574	697.2	431.5	47,349	201.8	129.3	17,482	74.5	44.0	11,387	48.5	26.0	12,087	51.5	30.2	9,976	42.5	25.5	5,606	23.9	13.5
民國105年	172,418	733.2	439.4	48,291	205.4	128.1	18,948	80.6	46.1	12,923	55.0	28.4	12,820	54.5	30.9	10,426	44.3	25.7	5,956	25.3	13.8
民國106年	171,857	729.6	424.3	48,571	206.2	124.7	18,795	79.8	44.4	13,206	56.1	28.0	12,721	54.0	29.7	10,306	43.8	24.6	6,149	26.1	13.6
民國107年	172,859	733.1	415.0	49,326	209.2	123.0	19,637	83.3	44.7	14,202	60.2	29.0	12,467	52.9	28.2	9,813	41.6	22.6	6,067	25.7	13.0
民國108年	175,424	743.4	408.2	50,232	212.9	121.3	19,859	84.2	43.6	15,185	64.4	30.0	12,176	51.6	26.7	9,996	42.4	22.3	6,255	26.5	12.9
民國109年	173,067	733.9	390.8	50,161	212.7	117.3	20,457	86.7	43.8	13,736	58.2	26.4	11,821	50.1	25.2	10,311	43.7	22.0	6,706	28.4	13.4
民國110年	184,172	784.8	405.5	51,656	220.1	118.2	21,852	93.1	45.6	13,549	57.7	25.3	12,182	51.9	25.2	11,450	48.8	23.8	7,886	33.6	15.2
轉換比值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0111	1.0111	1.0103	0.9104	0.9104	0.9162	1.0582	1.0582	1.0561	1.0822	1.0822	1.0805	1.0468	1.0468	1.0485	1.0127	1.0127	1.0215
原發布數																					
民國97年	142,283	618.7	484.3	38,913	169.2	133.7	15,726	68.4	51.7	8,661	37.7	27.5	10,663	46.4	35.0	8,036	34.9	26.9	3,507	15.2	11.2
民國98年	142,240	616.3	466.7	39,918	173.0	132.5	15,094	65.4	47.7	8,358	36.2	25.3	10,383	45.0	32.8	8,230	35.7	26.6	3,721	16.1	11.5
民國99年	144,709	625.3	455.6	41,046	177.4	131.6	15,675	67.7	47.4	8,909	38.5	25.6	10,134	43.8	30.6	8,211	35.5	25.3	4,174	18.0	12.2
民國100年	152,030	655.5	462.4	42,559	183.5	132.2	16,513	71.2	47.9	9,047	39.0	24.8	10,823	46.7	31.3	9,081	39.2	26.9	4,631	20.0	12.9
民國101年	153,823	661.0	450.6	43,665	187.6	131.3	17,121	73.6	47.9	9,314	40.0	24.4	11,061	47.5	30.8	9,281	39.9	26.5	4,986	21.4	13.3
民國102年	154,374	661.3	435.3	44,791	191.9	130.4	17,694	75.8	47.7	9,042	38.7	22.5	11,313	48.5	30.3	9,438	40.4	25.8	5,033	21.6	12.9
民國103年	162,886	696.0	443.5	46,093	196.9	130.2	19,399	82.9	50.2	10,353	44.2	24.7	11,733	50.1	30.4	9,846	42.1	26.0	5,459	23.3	13.5
民國104年	163,574	697.2	431.5	46,829	199.6	128.0	19,202	81.8	48.1	10,761	45.9	24.6	11,169	47.6	27.9	9,530	40.6	24.3	5,536	23.6	13.2
民國105年	172,418	733.2	439.4	47,760	203.1	126.8	20,812	88.5	50.3	12,212	51.9	26.9	11,846	50.4	28.6	9,960	42.4	24.5	5,881	25.0	13.5
民國106年	171,857	729.6	424.3	48,037	203.9	123.4	20,644	87.6	48.5	12,480	53.0	26.5	11,755	49.9	27.5	9,845	41.8	23.5	6,072	25.8	13.3
民國107年	172,859	733.1	415.0	48,784	206.9	121.8	21,569	91.5	48.8	13,421	56.9	27.4	11,520	48.9	26.1	9,374	39.8	21.5	5,991	25.4	12.8

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表1 歷年主要死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年 別	事故傷害			慢性下呼吸道疾病			腎炎、腎病症候群 及腎病變			慢性肝病及肝硬化			蓄意自我傷害(自殺)			血管性及未明示之失智症			衰老/老邁		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	7,077	30.8	27.0	5,875	25.5	18.5	3,495	15.2	11.5	5,116	22.2	17.7	4,128	17.9	15.2	690	3.0	2.1	2,498	10.9	7.8
民國98年	7,358	31.9	27.7	5,417	23.5	16.2	3,483	15.1	10.9	5,117	22.2	17.3	4,063	17.6	14.7	810	3.5	2.3	2,289	9.9	6.7
民國99年	6,669	28.8	24.4	5,682	24.6	16.2	3,576	15.5	10.8	5,111	22.1	16.8	3,889	16.8	13.8	859	3.7	2.3	2,348	10.1	6.5
民國100年	6,726	29.0	24.1	6,542	28.2	17.7	3,805	16.4	11.0	5,362	23.1	17.2	3,507	15.1	12.3	1,069	4.6	2.7	2,326	10.0	6.0
民國101年	6,873	29.5	23.8	6,916	29.7	17.9	3,769	16.2	10.6	5,177	22.2	16.2	3,766	16.2	13.1	1,242	5.3	3.0	2,102	9.0	5.1
民國102年	6,619	28.4	22.4	6,515	27.9	16.2	3,910	16.8	10.4	5,039	21.6	15.3	3,565	15.3	12.0	1,407	6.0	3.2	2,023	8.7	4.6
民國103年	7,118	30.4	23.7	7,027	30.0	16.7	4,240	18.1	10.9	5,163	22.1	15.4	3,542	15.1	11.8	1,663	7.1	3.6	2,258	9.6	4.9
民國104年	7,033	30.0	22.8	6,978	29.7	15.9	4,148	17.7	10.3	4,878	20.8	14.2	3,675	15.7	12.1	1,992	8.5	4.1	2,227	9.5	4.6
民國105年	7,206	30.6	23.1	7,420	31.6	16.5	4,552	19.4	10.8	4,930	21.0	13.9	3,765	16.0	12.3	2,362	10.0	4.6	2,396	10.2	4.7
民國106年	6,965	29.6	21.9	6,844	29.1	14.5	4,687	19.9	10.8	4,739	20.1	13.1	3,871	16.4	12.5	2,506	10.6	4.8	2,405	10.2	4.5
民國107年	6,846	29.0	21.1	6,719	28.5	13.9	4,811	20.4	10.7	4,490	19.0	12.1	3,865	16.4	12.5	2,215	9.4	4.1	2,300	9.8	4.2
民國108年	6,640	28.1	20.0	6,301	26.7	12.6	5,049	21.4	10.7	4,240	18.0	11.2	3,864	16.4	12.6	2,625	11.1	4.7	2,199	9.3	3.9
民國109年	6,767	28.7	20.3	5,657	24.0	11.0	5,096	21.6	10.5	3,964	16.8	10.3	3,656	15.5	11.8	2,885	12.2	5.0	2,385	10.1	4.0
民國110年	6,775	28.9	20.0	6,238	26.6	11.7	5,470	23.3	10.9	4,065	17.3	10.4	3,585	15.3	11.6	3,180	13.6	5.4	2,758	11.8	4.5
轉換比值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0932	1.0932	1.0913	0.8711	0.8711	0.8714	1.0406	1.0406	1.0393	1.0000	1.0000	1.0000	1.4563	1.4563	1.4592	1.5467	1.5467	1.5795
原發布數																					
民國97年	7,077	30.8	27.0	5,374	23.4	16.9	4,012	17.4	13.2	4,917	21.4	17.1	4,128	17.9	15.2	474	2.1	1.4	1,615	7.0	4.9
民國98年	7,358	31.9	27.7	4,955	21.5	14.9	3,999	17.3	12.5	4,918	21.3	16.6	4,063	17.6	14.7	556	2.4	1.6	1,480	6.4	4.3
民國99年	6,669	28.8	24.4	5,197	22.5	14.8	4,105	17.7	12.4	4,912	21.2	16.1	3,889	16.8	13.8	590	2.5	1.6	1,518	6.6	4.1
民國100年	6,726	29.0	24.1	5,984	25.8	16.2	4,368	18.8	12.6	5,153	22.2	16.5	3,507	15.1	12.3	734	3.2	1.9	1,504	6.5	3.8
民國101年	6,873	29.5	23.8	6,326	27.2	16.4	4,327	18.6	12.1	4,975	21.4	15.6	3,766	16.2	13.1	853	3.7	2.0	1,359	5.8	3.2
民國102年	6,619	28.4	22.4	5,959	25.5	14.9	4,489	19.2	11.9	4,843	20.7	14.8	3,565	15.3	12.0	966	4.1	2.2	1,308	5.6	2.9
民國103年	7,118	30.4	23.7	6,428	27.5	15.3	4,868	20.8	12.5	4,962	21.2	14.8	3,542	15.1	11.8	1,142	4.9	2.5	1,460	6.2	3.1
民國104年	7,033	30.0	22.8	6,383	27.2	14.6	4,762	20.3	11.8	4,688	20.0	13.6	3,675	15.7	12.1	1,368	5.8	2.8	1,440	6.1	2.9
民國105年	7,206	30.6	23.1	6,787	28.9	15.1	5,226	22.2	12.4	4,738	20.1	13.4	3,765	16.0	12.3	1,622	6.9	3.2	1,549	6.6	3.0
民國106年	6,965	29.6	21.9	6,260	26.6	13.3	5,381	22.8	12.4	4,554	19.3	12.6	3,871	16.4	12.5	1,721	7.3	3.3	1,555	6.6	2.9
民國107年	6,846	29.0	21.1	6,146	26.1	12.7	5,523	23.4	12.3	4,315	18.3	11.6	3,865	16.4	12.5	1,521	6.5	2.8	1,487	6.3	2.6

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表1 歷年主要死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年 別	敗血症			帕金森病			原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)			骨骼肌肉系統 及結締組織之疾病			主動脈瘤及剝離			嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)			肇因於吸入外物之肺部病 況		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	2,792	12.1	9.0	565	2.5	1.8	1,326	5.8	4.5	1,406	6.1	4.7	655	2.8	2.2	-	-	-	424	1.8	1.3
民國98年	2,862	12.4	8.9	594	2.6	1.8	1,125	4.9	3.6	1,441	6.2	4.6	598	2.6	1.9	-	-	-	382	1.7	1.2
民國99年	2,990	12.9	8.9	647	2.8	1.8	957	4.1	2.9	1,682	7.3	5.1	674	2.9	2.1	-	-	-	386	1.7	1.1
民國100年	3,070	13.2	8.6	791	3.4	2.2	1,054	4.5	3.1	1,403	6.1	4.3	648	2.8	1.9	-	-	-	409	1.8	1.1
民國101年	2,900	12.5	7.8	887	3.8	2.3	1,078	4.6	3.1	1,364	5.9	4.0	706	3.0	2.1	-	-	-	409	1.8	1.1
民國102年	2,723	11.7	7.1	972	4.2	2.5	1,177	5.0	3.2	1,388	5.9	3.9	734	3.1	2.0	-	-	-	395	1.7	1.0
民國103年	2,714	11.6	6.8	984	4.2	2.4	1,341	5.7	3.6	1,761	7.5	4.7	795	3.4	2.2	-	-	-	400	1.7	1.0
民國104年	2,708	11.5	6.5	1,100	4.7	2.6	1,370	5.8	3.5	1,781	7.6	4.6	740	3.2	1.9	-	-	-	414	1.8	1.0
民國105年	2,992	12.7	6.9	1,212	5.2	2.7	1,372	5.8	3.4	1,880	8.0	4.6	827	3.5	2.1	-	-	-	454	1.9	1.0
民國106年	2,964	12.6	6.6	1,217	5.2	2.7	1,489	6.3	3.5	1,544	6.6	3.8	806	3.4	2.0	-	-	-	433	1.8	0.9
民國107年	2,981	12.6	6.6	1,223	5.2	2.6	1,415	6.0	3.3	1,273	5.4	3.2	878	3.7	2.1	-	-	-	453	1.9	0.9
民國108年	2,925	12.4	6.1	1,365	5.8	2.8	1,447	6.1	3.3	1,299	5.5	3.2	907	3.8	2.1	-	-	-	518	2.2	1.0
民國109年	1,931	8.2	4.0	1,321	5.6	2.6	1,514	6.4	3.2	1,307	5.5	3.1	914	3.9	2.1	28 ^{註4}	0.1	0.1	724	3.1	1.4
民國110年	2,222	9.5	4.5	1,600	6.8	3.1	1,522	6.5	3.2	1,498	6.4	3.4	950	4.0	2.1	896 ^{註4}	3.8	2.0	867	3.7	1.6
轉換比值	0.7901	0.7901	0.7819	1.0382	1.0382	1.0352	0.9881	0.9881	0.9856	1.0965	1.0965	1.0976	0.9887	0.9887	0.9889	-	-	-	0.7023	0.7023	0.7012
原發布數																					
民國97年	3,534	15.4	11.6	544	2.4	1.7	1,342	5.8	4.5	1,282	5.6	4.3	662	2.9	2.2	-	-	-	603	2.6	1.9
民國98年	3,623	15.7	11.4	572	2.5	1.7	1,139	4.9	3.6	1,314	5.7	4.2	605	2.6	1.9	-	-	-	544	2.4	1.7
民國99年	3,784	16.4	11.3	623	2.7	1.8	968	4.2	3.0	1,534	6.6	4.6	682	2.9	2.1	-	-	-	550	2.4	1.6
民國100年	3,886	16.8	11.0	762	3.3	2.1	1,067	4.6	3.2	1,280	5.5	3.9	655	2.8	2.0	-	-	-	582	2.5	1.6
民國101年	3,671	15.8	10.0	854	3.7	2.3	1,091	4.7	3.1	1,244	5.3	3.7	714	3.1	2.1	-	-	-	583	2.5	1.5
民國102年	3,446	14.8	9.0	936	4.0	2.4	1,191	5.1	3.2	1,266	5.4	3.6	742	3.2	2.1	-	-	-	562	2.4	1.4
民國103年	3,435	14.7	8.7	948	4.1	2.3	1,357	5.8	3.6	1,606	6.9	4.3	804	3.4	2.2	-	-	-	570	2.4	1.4
民國104年	3,428	14.6	8.3	1,060	4.5	2.5	1,386	5.9	3.5	1,624	6.9	4.2	748	3.2	2.0	-	-	-	589	2.5	1.4
民國105年	3,787	16.1	8.9	1,167	5.0	2.6	1,388	5.9	3.4	1,715	7.3	4.2	836	3.6	2.2	-	-	-	646	2.7	1.4
民國106年	3,752	15.9	8.5	1,172	5.0	2.6	1,507	6.4	3.6	1,408	6.0	3.5	815	3.5	2.0	-	-	-	616	2.6	1.3
民國107年	3,773	16.0	8.4	1,178	5.0	2.5	1,432	6.1	3.3	1,161	4.9	2.9	888	3.8	2.1	-	-	-	645	2.7	1.3

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

4. 109年COVID-19死亡人數28人(含國人國外死亡21人)；110年COVID-19死亡人數896人(含國人國外死亡57人)。

附表2 歷年男性主要死亡原因

單位：人、每十萬人口

年 別	所有死亡原因			惡性腫瘤			心臟疾病 (高血壓性疾病除外)			肺炎			腦血管疾病			糖尿病			事故傷害		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	87,682	754.7	608.6	25,240	217.3	176.2	8,555	73.6	58.2	5,794	49.9	37.6	6,676	57.5	45.1	4,138	35.6	28.6	5,239	45.1	39.9
民國98年	87,074	748.6	586.6	25,555	219.7	173.3	8,196	70.5	54.2	5,494	47.2	34.2	6,611	56.8	43.2	4,235	36.4	28.4	5,354	46.0	40.3
民國99年	88,374	759.5	576.2	26,301	226.0	173.0	8,557	73.5	54.6	5,834	50.1	34.8	6,402	55.0	40.4	4,246	36.5	27.3	4,835	41.6	35.8
民國100年	93,155	800.3	590.6	27,335	234.8	175.5	9,028	77.6	55.7	5,943	51.1	34.1	6,866	59.0	42.0	4,687	40.3	29.4	4,875	41.9	35.5
民國101年	93,197	799.3	573.1	27,563	236.4	172.1	9,344	80.1	56.1	6,043	51.8	33.3	6,899	59.2	41.1	4,808	41.2	29.3	4,950	42.5	34.9
民國102年	93,340	799.2	556.6	28,182	241.3	171.1	9,624	82.4	56.1	5,955	51.0	31.5	7,085	60.7	40.7	4,864	41.6	28.7	4,733	40.5	32.8
民國103年	97,979	838.0	569.1	28,782	246.2	170.5	10,467	89.5	59.1	6,610	56.5	34.0	7,494	64.1	42.0	5,105	43.7	29.3	5,108	43.7	35.0
民國104年	98,230	839.2	557.2	29,085	248.5	168.0	10,248	87.6	56.6	6,897	58.9	34.3	7,074	60.4	38.7	5,073	43.3	28.4	5,096	43.5	34.3
民國105年	102,985	879.0	569.1	29,529	252.0	166.3	11,151	95.2	60.1	7,822	66.8	37.9	7,425	63.4	39.6	5,246	44.8	28.5	5,224	44.6	34.9
民國106年	101,686	867.7	548.5	29,661	253.1	162.4	10,976	93.7	57.9	7,923	67.6	37.4	7,387	63.0	38.4	5,158	44.0	27.5	4,923	42.0	32.4
民國107年	101,949	870.2	538.4	29,942	255.6	160.1	11,453	97.8	58.6	8,386	71.6	38.6	7,251	61.9	36.8	4,884	41.7	25.3	4,803	41.0	31.1
民國108年	103,004	879.7	531.7	30,543	260.8	158.8	11,375	97.1	56.9	8,935	76.3	40.4	7,009	59.9	34.7	5,044	43.1	25.4	4,701	40.1	30.0
民國109年	101,385	867.3	511.0	30,250	258.8	152.6	11,809	101.0	57.9	8,220	70.3	36.5	6,933	59.3	33.7	5,260	45.0	25.6	4,743	40.6	29.9
民國110年	107,064	920.9	530.1	31,121	267.7	154.0	12,639	108.7	61.1	8,058	69.3	35.1	7,083	60.9	33.3	5,778	49.7	27.6	4,717	40.6	29.4
轉換比值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0107	1.0107	1.0101	0.9114	0.9114	0.9169	1.0484	1.0484	1.0470	1.0736	1.0736	1.0731	1.0454	1.0454	1.0453	1.0000	1.0000	1.0000
原發布數																					
民國97年	87,682	754.7	608.6	24,972	215.0	174.4	9,386	80.8	63.5	5,527	47.6	35.9	6,218	53.5	42.0	3,958	34.1	27.4	5,239	45.1	39.9
民國98年	87,074	748.6	586.6	25,284	217.4	171.6	8,992	77.3	59.1	5,240	45.0	32.7	6,158	52.9	40.3	4,051	34.8	27.2	5,354	46.0	40.3
民國99年	88,374	759.5	576.2	26,022	223.6	171.3	9,389	80.7	59.6	5,565	47.8	33.3	5,963	51.2	37.6	4,062	34.9	26.1	4,835	41.6	35.8
民國100年	93,155	800.3	590.6	27,045	232.3	173.7	9,905	85.1	60.7	5,669	48.7	32.5	6,395	54.9	39.1	4,484	38.5	28.1	4,875	41.9	35.5
民國101年	93,197	799.3	573.1	27,270	233.9	170.4	10,252	87.9	61.1	5,764	49.4	31.8	6,426	55.1	38.3	4,599	39.4	28.0	4,950	42.5	34.9
民國102年	93,340	799.2	556.6	27,883	238.7	169.4	10,559	90.4	61.2	5,680	48.6	30.1	6,599	56.5	38.0	4,653	39.8	27.5	4,733	40.5	32.8
民國103年	97,979	838.0	569.1	28,476	243.6	168.8	11,484	98.2	64.5	6,305	53.9	32.4	6,980	59.7	39.1	4,883	41.8	28.1	5,108	43.7	35.0
民國104年	98,230	839.2	557.2	28,776	245.8	166.3	11,244	96.1	61.7	6,579	56.2	32.8	6,589	56.3	36.1	4,853	41.5	27.2	5,096	43.5	34.3
民國105年	102,985	879.0	569.1	29,215	249.4	164.6	12,235	104.4	65.5	7,461	63.7	36.2	6,916	59.0	36.9	5,018	42.8	27.3	5,224	44.6	34.9
民國106年	101,686	867.7	548.5	29,346	250.4	160.8	12,043	102.8	63.2	7,557	64.5	35.8	6,881	58.7	35.7	4,934	42.1	26.3	4,923	42.0	32.4
民國107年	101,949	870.2	538.4	29,624	252.8	158.5	12,566	107.3	63.9	7,999	68.3	36.9	6,754	57.6	34.3	4,672	39.9	24.2	4,803	41.0	31.1

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表2 歷年男性主要死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年 別	慢性下呼吸道疾病			高血壓性疾病			慢性肝病及肝硬化			腎炎、腎病症候群及腎病變			蓄意自我傷害(自殺)			血管性及未明示之失智症			衰老/老邁		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	4,329	37.3	27.7	1,827	15.7	12.2	3,704	31.9	26.0	1,759	15.1	11.9	2,820	24.3	20.8	318	2.7	2.0	1,218	10.5	7.9
民國98年	4,032	34.7	24.8	1,994	17.1	12.9	3,602	31.0	24.8	1,831	15.7	11.8	2,798	24.1	20.3	360	3.1	2.1	1,026	8.8	6.3
民國99年	4,182	35.9	24.6	2,173	18.7	13.6	3,634	31.2	24.6	1,821	15.6	11.5	2,639	22.7	18.8	404	3.5	2.3	1,129	9.7	6.5
民國100年	4,820	41.4	27.2	2,500	21.5	15.0	3,862	33.2	25.6	1,910	16.4	11.6	2,392	20.5	16.9	470	4.0	2.5	1,123	9.6	6.3
民國101年	5,125	44.0	27.8	2,569	22.0	14.8	3,700	31.7	24.1	1,953	16.8	11.5	2,430	20.8	17.0	556	4.8	2.8	976	8.4	5.1
民國102年	4,822	41.3	25.3	2,589	22.2	14.5	3,639	31.2	23.2	1,968	16.9	11.1	2,388	20.4	16.3	624	5.3	3.1	921	7.9	4.5
民國103年	5,139	44.0	26.1	2,885	24.7	15.7	3,686	31.5	23.1	2,216	19.0	12.2	2,362	20.2	15.9	734	6.3	3.5	1,000	8.6	4.7
民國104年	5,178	44.2	25.6	2,914	24.9	15.6	3,474	29.7	21.3	2,104	18.0	11.3	2,426	20.7	16.3	907	7.7	4.1	1,068	9.1	4.9
民國105年	5,394	46.0	26.3	3,127	26.7	16.2	3,526	30.1	21.2	2,281	19.5	11.8	2,559	21.8	17.0	1,086	9.3	4.7	1,145	9.8	5.1
民國106年	4,907	41.9	23.2	3,156	26.9	15.9	3,311	28.3	19.7	2,306	19.7	11.7	2,574	22.0	16.9	1,142	9.7	4.9	1,070	9.1	4.5
民國107年	4,892	41.8	22.7	3,072	26.2	15.1	3,172	27.1	18.4	2,432	20.8	12.1	2,551	21.8	16.6	1,012	8.6	4.3	1,026	8.8	4.3
民國108年	4,546	38.8	20.6	3,104	26.5	14.9	3,011	25.7	17.3	2,583	22.1	12.4	2,554	21.8	16.9	1,178	10.1	4.9	1,015	8.7	4.2
民國109年	4,097	35.0	18.2	3,410	29.2	16.0	2,872	24.6	16.3	2,549	21.8	12.0	2,404	20.6	15.6	1,267	10.8	5.2	1,061	9.1	4.2
民國110年	4,382	37.7	19.1	3,999	34.4	18.3	2,918	25.1	16.3	2,751	23.7	12.7	2,330	20.0	15.2	1,375	11.8	5.6	1,251	10.8	4.9
轉換比值	1.0939	1.0939	1.0933	1.0213	1.0213	1.0311	1.0359	1.0359	1.0359	0.8720	0.8720	0.8715	1.0000	1.0000	1.0000	1.4795	1.4795	1.4847	1.6132	1.6132	1.6556
原發布數																					
民國97年	3,957	34.1	25.3	1,789	15.4	11.9	3,576	30.8	25.1	2,017	17.4	13.7	2,820	24.3	20.8	215	1.9	1.3	755	6.5	4.7
民國98年	3,686	31.7	22.6	1,952	16.8	12.5	3,477	29.9	24.0	2,100	18.1	13.5	2,798	24.1	20.3	243	2.1	1.4	636	5.5	3.8
民國99年	3,823	32.9	22.5	2,128	18.3	13.1	3,508	30.1	23.7	2,088	17.9	13.1	2,639	22.7	18.8	273	2.3	1.5	700	6.0	3.9
民國100年	4,406	37.9	24.8	2,448	21.0	14.5	3,728	32.0	24.7	2,190	18.8	13.3	2,392	20.5	16.9	318	2.7	1.7	696	6.0	3.8
民國101年	4,685	40.2	25.5	2,515	21.6	14.3	3,572	30.6	23.3	2,240	19.2	13.2	2,430	20.8	17.0	376	3.2	1.9	605	5.2	3.1
民國102年	4,408	37.7	23.2	2,535	21.7	14.1	3,513	30.1	22.4	2,257	19.3	12.8	2,388	20.4	16.3	422	3.6	2.1	571	4.9	2.7
民國103年	4,698	40.2	23.9	2,825	24.2	15.2	3,558	30.4	22.3	2,541	21.7	14.0	2,362	20.2	15.9	496	4.2	2.4	620	5.3	2.8
民國104年	4,733	40.4	23.4	2,853	24.4	15.1	3,354	28.7	20.6	2,413	20.6	12.9	2,426	20.7	16.3	613	5.2	2.8	662	5.7	2.9
民國105年	4,931	42.1	24.0	3,062	26.1	15.7	3,404	29.1	20.5	2,616	22.3	13.6	2,559	21.8	17.0	734	6.3	3.2	710	6.1	3.1
民國106年	4,486	38.3	21.2	3,090	26.4	15.4	3,196	27.3	19.0	2,644	22.6	13.4	2,574	22.0	16.9	772	6.6	3.3	663	5.7	2.7
民國107年	4,472	38.2	20.8	3,008	25.7	14.6	3,062	26.1	17.8	2,789	23.8	13.8	2,551	21.8	16.6	684	5.8	2.9	636	5.4	2.6

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表2 歷年男性主要死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年 別	敗血症			原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)			帕金森病			骨骼肌肉系統 及結締組織之疾病			主動脈瘤及剝離			嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)			肇因於吸入外物之肺部病 況		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	1,494	12.9	9.9	825	7.1	5.6	346	3.0	2.2	693	6.0	4.7	479	4.1	3.2	-	-	-	245	2.1	1.6
民國98年	1,525	13.1	9.8	650	5.6	4.3	361	3.1	2.2	655	5.6	4.3	410	3.5	2.7	-	-	-	224	1.9	1.4
民國99年	1,575	13.5	9.7	561	4.8	3.5	376	3.2	2.2	777	6.7	4.9	477	4.1	3.1	-	-	-	233	2.0	1.4
民國100年	1,775	15.3	10.5	580	5.0	3.6	461	4.0	2.6	689	5.9	4.3	454	3.9	2.8	-	-	-	258	2.2	1.5
民國101年	1,650	14.2	9.4	604	5.2	3.6	508	4.4	2.8	657	5.6	4.0	480	4.1	2.9	-	-	-	247	2.1	1.4
民國102年	1,610	13.8	8.9	700	6.0	4.0	541	4.6	2.9	678	5.8	4.0	505	4.3	3.0	-	-	-	239	2.0	1.3
民國103年	1,545	13.2	8.4	754	6.4	4.2	562	4.8	2.9	843	7.2	4.7	526	4.5	3.0	-	-	-	242	2.1	1.2
民國104年	1,609	13.7	8.3	819	7.0	4.5	629	5.4	3.2	810	6.9	4.5	486	4.2	2.7	-	-	-	239	2.0	1.2
民國105年	1,697	14.5	8.7	790	6.7	4.2	697	6.0	3.4	871	7.4	4.7	587	5.0	3.3	-	-	-	268	2.3	1.3
民國106年	1,702	14.5	8.5	876	7.5	4.5	661	5.6	3.2	728	6.2	3.9	561	4.8	3.0	-	-	-	243	2.1	1.2
民國107年	1,711	14.6	8.5	821	7.0	4.2	690	5.9	3.3	600	5.1	3.2	575	4.9	3.1	-	-	-	262	2.2	1.2
民國108年	1,642	14.0	7.8	814	7.0	4.0	773	6.6	3.6	627	5.4	3.3	624	5.3	3.2	-	-	-	287	2.5	1.3
民國109年	1,016	8.7	4.8	860	7.4	4.1	723	6.2	3.3	636	5.4	3.3	584	5.0	3.0	22 ^{註4}	0.2	0.1	400	3.4	1.8
民國110年	1,167	10.0	5.5	849	7.3	4.0	838	7.2	3.7	706	6.1	3.5	612	5.3	3.1	581 ^{註4}	5.0	2.8	469	4.0	2.1
轉換比值	0.7739	0.7739	0.7693	0.9868	0.9868	0.9864	1.0360	1.0360	1.0336	1.0830	1.0830	1.0867	0.9914	0.9914	0.9905	-	-	-	0.6987	0.6987	0.7010
原發布數																					
民國97年	1,930	16.6	12.9	836	7.2	5.7	334	2.9	2.1	640	5.5	4.3	483	4.2	3.3	-	-	-	351	3.0	2.3
民國98年	1,971	16.9	12.8	659	5.7	4.4	348	3.0	2.1	605	5.2	3.9	414	3.6	2.7	-	-	-	321	2.8	2.0
民國99年	2,035	17.5	12.6	569	4.9	3.6	363	3.1	2.1	717	6.2	4.5	481	4.1	3.1	-	-	-	333	2.9	2.0
民國100年	2,294	19.7	13.6	588	5.1	3.6	445	3.8	2.5	636	5.5	4.0	458	3.9	2.8	-	-	-	369	3.2	2.1
民國101年	2,132	18.3	12.2	612	5.2	3.7	490	4.2	2.7	607	5.2	3.7	484	4.2	2.9	-	-	-	353	3.0	1.9
民國102年	2,081	17.8	11.6	709	6.1	4.1	522	4.5	2.8	626	5.4	3.7	509	4.4	3.0	-	-	-	342	2.9	1.8
民國103年	1,997	17.1	10.9	764	6.5	4.3	542	4.6	2.8	778	6.7	4.3	531	4.5	3.1	-	-	-	347	3.0	1.8
民國104年	2,079	17.8	10.9	830	7.1	4.6	607	5.2	3.1	748	6.4	4.1	490	4.2	2.8	-	-	-	342	2.9	1.7
民國105年	2,193	18.7	11.3	801	6.8	4.3	673	5.7	3.3	804	6.9	4.3	592	5.1	3.3	-	-	-	383	3.3	1.9
民國106年	2,200	18.8	11.0	888	7.6	4.6	638	5.4	3.1	672	5.7	3.6	566	4.8	3.0	-	-	-	348	3.0	1.6
民國107年	2,211	18.9	11.0	832	7.1	4.3	666	5.7	3.2	554	4.7	2.9	580	5.0	3.1	-	-	-	375	3.2	1.7

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

4. 109年COVID-19死亡人數22人(含國人國外死亡16人)；110年COVID-19死亡人數581人(含國人國外死亡43人)。

附表3 歷年女性主要死亡原因

單位：人、每十萬人口

年 別	所有死亡原因			惡性腫瘤			心臟疾病 (高血壓性疾病除外)			糖尿病			肺炎			腦血管疾病			高血壓性疾病			
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	
經轉換比值調整後值																						
民國97年	54,601	479.8	362.5	14,105	123.9	95.4	5,762	50.6	36.8	4,274	37.6	27.9	3,371	29.5	20.8	4,864	42.7	30.8	1,724	15.2	10.7	
民國98年	55,166	481.9	350.5	14,806	129.3	96.1	5,546	48.5	33.5	4,380	38.3	27.4	3,350	29.2	19.4	4,626	40.4	28.0	1,774	15.5	10.5	
民國99年	56,335	489.7	339.9	15,201	132.1	94.9	5,714	49.7	32.8	4,350	37.8	25.6	3,593	31.2	19.7	4,565	39.7	26.2	2,054	17.9	11.4	
民國100年	58,875	509.6	340.6	15,697	135.9	94.4	6,006	52.0	32.7	4,819	41.7	27.0	3,630	31.4	18.8	4,847	41.9	26.3	2,190	19.0	11.5	
民國101年	60,626	522.1	335.4	16,587	142.9	96.1	6,243	53.8	32.5	4,908	42.3	26.2	3,813	32.8	18.8	5,071	43.7	26.1	2,480	21.4	12.4	
民國102年	61,034	523.2	322.0	17,107	146.6	95.7	6,485	55.6	32.1	5,016	43.0	25.5	3,613	30.9	16.6	5,158	44.2	25.4	2,508	21.5	11.8	
民國103年	64,907	554.2	327.2	17,823	152.2	95.9	7,194	61.4	33.8	5,202	44.4	25.3	4,345	37.1	19.0	5,204	44.4	24.5	2,643	22.6	11.9	
民國104年	65,344	555.7	316.1	18,264	155.3	94.4	7,234	61.5	32.4	4,903	41.7	22.7	4,490	38.2	18.7	5,013	42.6	22.5	2,692	22.9	11.4	
民國105年	69,433	588.4	321.2	18,762	159.0	93.8	7,797	66.1	33.3	5,180	43.9	23.0	5,101	43.2	20.2	5,395	45.7	23.1	2,829	24.0	11.5	
民國106年	70,171	592.9	312.2	18,910	159.8	91.2	7,819	66.1	32.0	5,148	43.5	21.9	5,283	44.6	20.0	5,334	45.1	22.0	2,993	25.3	11.5	
民國107年	70,910	597.7	304.5	19,384	163.4	90.3	8,184	69.0	32.1	4,929	41.5	20.0	5,816	49.0	20.9	5,216	44.0	20.6	2,995	25.2	11.1	
民國108年	72,420	609.2	297.8	19,689	165.6	88.5	8,484	71.4	31.4	4,952	41.7	19.2	6,250	52.6	21.5	5,167	43.5	19.5	3,151	26.5	11.1	
民國109年	71,682	602.7	284.3	19,911	167.4	86.7	8,648	72.7	31.0	5,051	42.5	18.6	5,516	46.4	18.1	4,888	41.1	17.9	3,296	27.7	11.0	
民國110年	77,108	651.1	295.4	20,535	173.4	87.1	9,213	77.8	31.6	5,672	47.9	20.2	5,491	46.4	17.5	5,099	43.1	18.1	3,887	32.8	12.3	
轉換比值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0117	1.0117	1.0107	0.9090	0.9090	0.9143	1.0483	1.0483	1.0516	1.0727	1.0727	1.0710	1.0944	1.0944	1.0917	1.0040	1.0040	1.0078	
原發布數																						
民國97年	54,601	479.8	362.5	13,941	122.5	94.4	6,340	55.7	40.2	4,078	35.8	26.5	3,134	27.5	19.4	4,445	39.1	28.2	1,718	15.1	10.6	
民國98年	55,166	481.9	350.5	14,634	127.8	95.1	6,102	53.3	36.7	4,179	36.5	26.0	3,118	27.2	18.2	4,225	36.9	25.7	1,769	15.5	10.5	
民國99年	56,335	489.7	339.9	15,024	130.6	93.9	6,286	54.6	35.9	4,149	36.1	24.4	3,344	29.1	18.4	4,171	36.3	24.0	2,046	17.8	11.4	
民國100年	58,875	509.6	340.6	15,514	134.3	93.4	6,608	57.2	35.8	4,597	39.8	25.7	3,378	29.2	17.5	4,428	38.3	24.1	2,183	18.9	11.4	
民國101年	60,626	522.1	335.4	16,395	141.2	95.1	6,869	59.2	35.5	4,682	40.3	24.9	3,550	30.6	17.5	4,635	39.9	23.9	2,471	21.3	12.3	
民國102年	61,034	523.2	322.0	16,908	144.9	94.7	7,135	61.2	35.1	4,785	41.0	24.2	3,362	28.8	15.5	4,714	40.4	23.2	2,498	21.4	11.7	
民國103年	64,907	554.2	327.2	17,617	150.4	94.9	7,915	67.6	37.0	4,963	42.4	24.0	4,048	34.6	17.8	4,753	40.6	22.4	2,634	22.5	11.8	
民國104年	65,344	555.7	316.1	18,053	153.5	93.4	7,958	67.7	35.5	4,677	39.8	21.6	4,182	35.6	17.5	4,580	39.0	20.6	2,683	22.8	11.4	
民國105年	69,433	588.4	321.2	18,545	157.2	92.8	8,577	72.7	36.4	4,942	41.9	21.9	4,751	40.3	18.9	4,930	41.8	21.2	2,819	23.9	11.4	
民國106年	70,171	592.9	312.2	18,691	157.9	90.2	8,601	72.7	35.0	4,911	41.5	20.8	4,923	41.6	18.6	4,874	41.2	20.1	2,982	25.2	11.4	
民國107年	70,910	597.7	304.5	19,160	161.5	89.3	9,003	75.9	35.1	4,702	39.6	19.0	5,422	45.7	19.5	4,766	40.2	18.9	2,983	25.1	11.0	

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表3 歷年女性主要死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年 別	腎炎、腎病症候群 及腎病變			事故傷害			慢性下呼吸道疾病			血管性及未明示之失智症			衰老/老邁			蓄意自我傷害(自殺)			慢性肝病及肝硬化		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	1,736	15.3	11.2	1,838	16.2	14.1	1,546	13.6	9.5	372	3.3	2.2	1,280	11.3	7.7	1,308	11.5	9.7	1,412	12.4	9.5
民國98年	1,652	14.4	10.1	2,004	17.5	15.1	1,385	12.1	8.0	450	3.9	2.5	1,263	11.0	7.1	1,265	11.1	9.2	1,515	13.2	9.8
民國99年	1,755	15.3	10.2	1,834	15.9	13.1	1,500	13.0	8.2	455	4.0	2.4	1,219	10.6	6.5	1,250	10.9	8.8	1,477	12.8	9.1
民國100年	1,895	16.4	10.5	1,851	16.0	12.8	1,722	14.9	8.9	599	5.2	2.9	1,203	10.5	5.9	1,115	9.7	7.7	1,500	13.0	8.9
民國101年	1,816	15.6	9.7	1,923	16.6	12.8	1,791	15.4	8.8	686	5.9	3.1	1,126	9.7	5.2	1,336	11.5	9.3	1,477	12.7	8.5
民國102年	1,942	16.6	9.7	1,886	16.2	12.2	1,693	14.5	7.9	783	6.7	3.4	1,102	9.5	4.7	1,177	10.1	7.8	1,400	12.0	7.7
民國103年	2,024	17.3	9.7	2,010	17.2	12.8	1,888	16.1	8.3	929	7.9	3.8	1,258	10.7	5.0	1,180	10.1	7.7	1,477	12.6	7.8
民國104年	2,044	17.4	9.4	1,937	16.5	11.7	1,800	15.3	7.5	1,085	9.2	4.2	1,159	9.9	4.4	1,249	10.6	8.1	1,404	11.9	7.2
民國105年	2,271	19.2	9.9	1,982	16.8	11.6	2,026	17.2	8.1	1,276	10.8	4.6	1,251	10.6	4.5	1,206	10.2	7.7	1,404	11.9	6.8
民國106年	2,381	20.1	9.9	2,042	17.3	11.8	1,937	16.4	7.3	1,364	11.5	4.7	1,335	11.3	4.5	1,297	11.0	8.3	1,428	12.1	6.7
民國107年	2,379	20.1	9.4	2,043	17.2	11.5	1,827	15.4	6.7	1,203	10.1	4.0	1,274	10.7	4.1	1,314	11.1	8.5	1,318	11.1	5.9
民國108年	2,466	20.7	9.2	1,939	16.3	10.5	1,755	14.8	6.1	1,447	12.2	4.6	1,184	10.0	3.6	1,310	11.0	8.4	1,229	10.3	5.3
民國109年	2,547	21.4	9.2	2,024	17.0	11.1	1,560	13.1	5.3	1,618	13.6	4.9	1,324	11.1	3.8	1,252	10.5	8.3	1,092	9.2	4.6
民國110年	2,719	23.0	9.4	2,058	17.4	11.0	1,856	15.7	5.9	1,805	15.2	5.2	1,507	12.7	4.1	1,255	10.6	8.2	1,147	9.7	4.7
轉換比值	0.8702	0.8702	0.8709	1.0000	1.0000	1.0000	1.0914	1.0914	1.0854	1.4373	1.4373	1.4372	1.4971	1.4971	1.5190	1.0000	1.0000	1.0000	1.0519	1.0519	1.0486
原發布數																					
民國97年	1,995	17.5	12.8	1,838	16.2	14.1	1,417	12.5	8.8	259	2.3	1.5	860	7.6	5.1	1,308	11.5	9.7	1,341	11.8	9.1
民國98年	1,899	16.6	11.6	2,004	17.5	15.1	1,269	11.1	7.4	313	2.7	1.7	844	7.4	4.7	1,265	11.1	9.2	1,441	12.6	9.4
民國99年	2,017	17.5	11.7	1,834	15.9	13.1	1,374	11.9	7.6	317	2.8	1.7	818	7.1	4.3	1,250	10.9	8.8	1,404	12.2	8.7
民國100年	2,178	18.9	12.0	1,851	16.0	12.8	1,578	13.7	8.2	416	3.6	2.0	808	7.0	3.9	1,115	9.7	7.7	1,425	12.3	8.5
民國101年	2,087	18.0	11.1	1,923	16.6	12.8	1,641	14.1	8.1	477	4.1	2.2	754	6.5	3.4	1,336	11.5	9.3	1,403	12.1	8.1
民國102年	2,232	19.1	11.2	1,886	16.2	12.2	1,551	13.3	7.3	544	4.7	2.4	737	6.3	3.1	1,177	10.1	7.8	1,330	11.4	7.4
民國103年	2,327	19.9	11.2	2,010	17.2	12.8	1,730	14.8	7.7	646	5.5	2.6	840	7.2	3.3	1,180	10.1	7.7	1,404	12.0	7.5
民國104年	2,349	20.0	10.8	1,937	16.5	11.7	1,650	14.0	6.9	755	6.4	2.9	778	6.6	2.9	1,249	10.6	8.1	1,334	11.3	6.8
民國105年	2,610	22.1	11.4	1,982	16.8	11.6	1,856	15.7	7.5	888	7.5	3.2	839	7.1	3.0	1,206	10.2	7.7	1,334	11.3	6.5
民國106年	2,737	23.1	11.4	2,042	17.3	11.8	1,774	15.0	6.7	949	8.0	3.3	892	7.5	3.0	1,297	11.0	8.3	1,358	11.5	6.4
民國107年	2,734	23.0	10.8	2,043	17.2	11.5	1,674	14.1	6.2	837	7.1	2.8	851	7.2	2.7	1,314	11.1	8.5	1,253	10.6	5.7

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表3 歷年女性主要死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年 別	敗血症			骨骼肌肉系統 及結締組織之疾病			帕金森病			原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)			肇因於吸入外物之肺部病 況			皮膚及皮下組織疾病			主動脈瘤及剝離		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	1,298	11.5	8.2	713	6.3	4.7	219	1.9	1.4	501	4.4	3.3	179	1.6	1.1	250	2.2	1.5	176	1.5	1.1
民國98年	1,337	11.7	8.0	786	6.9	4.9	233	2.0	1.4	475	4.2	2.9	158	1.4	1.0	245	2.1	1.4	188	1.6	1.2
民國99年	1,415	12.4	8.1	905	7.9	5.2	271	2.4	1.5	396	3.4	2.3	153	1.3	0.8	247	2.1	1.4	197	1.7	1.2
民國100年	1,295	11.2	6.9	714	6.2	4.2	330	2.9	1.7	474	4.1	2.7	151	1.3	0.8	275	2.4	1.5	194	1.7	1.1
民國101年	1,250	10.8	6.4	707	6.1	4.0	379	3.3	1.9	474	4.1	2.5	162	1.4	0.8	286	2.5	1.4	226	1.9	1.2
民國102年	1,113	9.5	5.4	710	6.1	3.8	431	3.7	2.1	477	4.1	2.4	156	1.3	0.7	246	2.1	1.2	229	2.0	1.2
民國103年	1,169	10.0	5.4	918	7.8	4.6	422	3.6	1.9	587	5.0	2.9	158	1.3	0.7	278	2.4	1.3	269	2.3	1.3
民國104年	1,099	9.3	4.9	971	8.3	4.7	471	4.0	2.1	551	4.7	2.6	175	1.5	0.7	282	2.4	1.3	254	2.2	1.2
民國105年	1,295	11.0	5.4	1,009	8.6	4.6	515	4.4	2.1	582	4.9	2.6	186	1.6	0.8	310	2.6	1.3	240	2.0	1.1
民國106年	1,262	10.7	5.0	816	6.9	3.7	556	4.7	2.2	613	5.2	2.6	190	1.6	0.7	251	2.1	1.0	245	2.1	1.1
民國107年	1,270	10.7	5.0	673	5.7	3.2	533	4.5	2.0	594	5.0	2.5	191	1.6	0.7	280	2.4	1.0	303	2.6	1.3
民國108年	1,283	10.8	4.7	672	5.7	3.1	592	5.0	2.2	633	5.3	2.6	231	1.9	0.8	253	2.1	0.9	283	2.4	1.1
民國109年	915	7.7	3.4	671	5.6	2.8	598	5.0	2.1	654	5.5	2.5	324	2.7	1.1	311	2.6	1.1	330	2.8	1.3
民國110年	1,055	8.9	3.7	792	6.7	3.3	762	6.4	2.6	673	5.7	2.5	398	3.4	1.3	348	2.9	1.2	338	2.9	1.3
轉換比值	0.8131	0.8131	0.8015	1.1087	1.1087	1.1077	1.0410	1.0410	1.0370	0.9900	0.9900	0.9820	0.7074	0.7074	0.7015	0.9929	0.9929	1.0005	0.9838	0.9838	0.9861
原發布數																					
民國97年	1,604	14.1	10.2	642	5.6	4.2	210	1.8	1.3	506	4.4	3.3	252	2.2	1.6	251	2.2	1.5	179	1.6	1.2
民國98年	1,652	14.4	10.0	709	6.2	4.4	224	2.0	1.3	480	4.2	3.0	223	1.9	1.4	247	2.2	1.4	191	1.7	1.2
民國99年	1,749	15.2	10.1	817	7.1	4.7	260	2.3	1.5	399	3.5	2.4	217	1.9	1.2	249	2.2	1.4	201	1.7	1.2
民國100年	1,592	13.8	8.6	644	5.6	3.8	317	2.7	1.7	479	4.1	2.7	213	1.8	1.1	277	2.4	1.5	197	1.7	1.1
民國101年	1,539	13.3	7.9	637	5.5	3.6	364	3.1	1.9	479	4.1	2.6	230	2.0	1.1	288	2.5	1.4	230	2.0	1.3
民國102年	1,365	11.7	6.7	640	5.5	3.4	414	3.5	2.0	482	4.1	2.5	220	1.9	1.0	248	2.1	1.2	233	2.0	1.2
民國103年	1,438	12.3	6.7	828	7.1	4.2	406	3.5	1.9	593	5.1	3.0	223	1.9	1.0	280	2.4	1.3	273	2.3	1.4
民國104年	1,349	11.5	6.1	876	7.5	4.2	453	3.9	2.0	556	4.7	2.7	247	2.1	1.0	284	2.4	1.3	258	2.2	1.2
民國105年	1,594	13.5	6.8	911	7.7	4.1	494	4.2	2.0	587	5.0	2.6	263	2.2	1.1	312	2.6	1.3	244	2.1	1.1
民國106年	1,552	13.1	6.3	736	6.2	3.3	534	4.5	2.1	619	5.2	2.7	268	2.3	1.0	252	2.1	1.0	249	2.1	1.1
民國107年	1,562	13.2	6.2	607	5.1	2.9	512	4.3	1.9	600	5.1	2.5	270	2.3	1.0	282	2.4	1.0	308	2.6	1.3

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表4 歷年主要癌症死亡原因

單位：人、每十萬人口

年 別	氣管、支氣管和肺癌			肝和肝內膽管癌			結腸、直腸和肛門癌			女性乳癌			前列腺(攝護腺)癌		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	7,850	34.1	26.5	7,721	33.6	27.0	4,466	19.4	15.0	1,600	14.1	11.1	942	8.1	6.1
民國98年	8,026	34.8	26.2	7,830	33.9	26.4	4,743	20.6	15.4	1,650	14.4	11.0	988	8.5	6.2
民國99年	8,271	35.7	26.0	7,815	33.8	25.4	4,895	21.2	15.3	1,772	15.4	11.4	1,078	9.3	6.5
民國100年	8,621	37.2	26.3	8,095	34.9	25.5	5,152	22.2	15.6	1,923	16.6	12.0	1,157	9.9	6.8
民國101年	8,667	37.2	25.6	8,190	35.2	24.9	5,372	23.1	15.6	1,986	17.1	12.0	1,253	10.7	7.1
民國102年	8,937	38.3	25.5	8,292	35.5	24.4	5,512	23.6	15.6	2,037	17.5	12.0	1,274	10.9	7.0
民國103年	9,253	39.5	25.6	8,253	35.3	23.5	5,866	25.1	16.0	2,151	18.4	12.4	1,286	11.0	6.8
民國104年	9,319	39.7	24.9	8,333	35.5	23.0	5,954	25.4	15.6	2,223	18.9	12.5	1,300	11.1	6.7
民國105年	9,460	40.2	24.6	8,429	35.8	22.4	5,990	25.5	15.3	2,260	19.1	12.2	1,422	12.1	7.2
民國106年	9,322	39.6	23.3	8,479	36.0	21.8	6,084	25.8	15.0	2,468	20.9	13.0	1,470	12.5	7.3
民國107年	9,476	40.2	23.0	8,297	35.2	20.5	6,096	25.9	14.6	2,511	21.2	12.9	1,454	12.4	7.0
民國108年	9,701	41.1	22.8	7,881	33.4	18.8	6,436	27.3	14.9	2,633	22.2	13.1	1,538	13.1	7.1
民國109年	9,629	40.8	21.8	7,773	33.0	18.0	6,489	27.5	14.6	2,655	22.3	12.8	1,730	14.8	7.8
民國110年	10,040	42.8	22.2	7,970	34.0	17.9	6,657	28.4	14.6	2,913	24.6	13.8	1,689	14.5	7.5
轉換比值	1.0094	1.0094	1.0090	1.0091	1.0091	1.0087	1.0469	1.0469	1.0452	1.0385	1.0385	1.0368	1.0559	1.0559	1.0544
原發布數															
民國97年	7,777	33.8	26.3	7,651	33.3	26.8	4,266	18.5	14.4	1,541	13.5	10.7	892	7.7	5.7
民國98年	7,951	34.5	25.9	7,759	33.6	26.2	4,531	19.6	14.8	1,589	13.9	10.6	936	8.0	5.9
民國99年	8,194	35.4	25.8	7,744	33.5	25.2	4,676	20.2	14.6	1,706	14.8	11.0	1,021	8.8	6.1
民國100年	8,541	36.8	26.0	8,022	34.6	25.3	4,921	21.2	15.0	1,852	16.0	11.6	1,096	9.4	6.4
民國101年	8,587	36.9	25.4	8,116	34.9	24.7	5,131	22.0	14.9	1,912	16.5	11.6	1,187	10.2	6.7
民國102年	8,854	37.9	25.3	8,217	35.2	24.2	5,265	22.6	14.9	1,962	16.8	11.6	1,207	10.3	6.6
民國103年	9,167	39.2	25.3	8,178	34.9	23.3	5,603	23.9	15.3	2,071	17.7	11.9	1,218	10.4	6.5
民國104年	9,232	39.3	24.7	8,258	35.2	22.8	5,687	24.2	14.9	2,141	18.2	12.0	1,231	10.5	6.4
民國105年	9,372	39.9	24.4	8,353	35.5	22.2	5,722	24.3	14.6	2,176	18.4	11.8	1,347	11.5	6.8
民國106年	9,235	39.2	23.1	8,402	35.7	21.6	5,812	24.7	14.4	2,377	20.1	12.6	1,392	11.9	6.9
民國107年	9,388	39.8	22.8	8,222	34.9	20.3	5,823	24.7	14.0	2,418	20.4	12.5	1,377	11.8	6.6

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表4 歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年 別	口腔癌			胰臟癌			胃癌			食道癌			卵巢癌		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	2,403	10.4	8.4	1,387	6.0	4.8	2,388	10.4	7.9	1,512	6.6	5.2	427	3.8	3.0
民國98年	2,436	10.6	8.3	1,505	6.5	5.0	2,377	10.3	7.6	1,572	6.8	5.3	452	3.9	3.0
民國99年	2,567	11.1	8.5	1,495	6.5	4.8	2,355	10.2	7.3	1,650	7.1	5.4	448	3.9	2.9
民國100年	2,668	11.5	8.6	1,634	7.0	5.0	2,384	10.3	7.1	1,591	6.9	5.0	459	4.0	2.9
民國101年	2,780	11.9	8.8	1,657	7.1	4.9	2,486	10.7	7.2	1,669	7.2	5.1	545	4.7	3.3
民國102年	2,918	12.5	8.9	1,829	7.8	5.3	2,335	10.0	6.5	1,752	7.5	5.2	576	4.9	3.4
民國103年	2,943	12.6	8.8	1,922	8.2	5.4	2,448	10.5	6.6	1,890	8.1	5.5	566	4.8	3.2
民國104年	2,889	12.3	8.4	1,981	8.4	5.4	2,423	10.3	6.3	1,907	8.1	5.4	546	4.6	3.0
民國105年	3,180	13.5	9.0	2,030	8.6	5.3	2,412	10.3	6.1	1,827	7.8	5.1	677	5.7	3.7
民國106年	3,079	13.1	8.5	2,117	9.0	5.4	2,400	10.2	5.8	1,897	8.1	5.1	665	5.6	3.5
民國107年	3,279	13.9	8.8	2,331	9.9	5.7	2,395	10.2	5.7	2,036	8.6	5.4	644	5.4	3.3
民國108年	3,425	14.5	8.9	2,497	10.6	5.9	2,379	10.1	5.5	1,983	8.4	5.1	683	5.7	3.5
民國109年	3,380	14.3	8.6	2,450	10.4	5.7	2,339	9.9	5.2	1,954	8.3	4.9	724	6.1	3.6
民國110年	3,395	14.5	8.5	2,659	11.3	6.0	2,310	9.8	5.0	2,030	8.6	5.0	696	5.9	3.3
轉換比值	1.0833	1.0833	1.0832	1.0170	1.0170	1.0158	1.0418	1.0418	1.0386	1.0555	1.0555	1.0543	1.0321	1.0321	1.0303
原發布數															
民國97年	2,218	9.6	7.8	1,364	5.9	4.7	2,292	10.0	7.6	1,433	6.2	5.0	414	3.6	2.9
民國98年	2,249	9.7	7.6	1,480	6.4	4.9	2,282	9.9	7.3	1,489	6.5	5.0	438	3.8	2.9
民國99年	2,370	10.2	7.8	1,470	6.4	4.7	2,261	9.8	7.0	1,563	6.8	5.1	434	3.8	2.8
民國100年	2,463	10.6	7.9	1,607	6.9	4.9	2,288	9.9	6.8	1,507	6.5	4.7	445	3.9	2.8
民國101年	2,566	11.0	8.1	1,629	7.0	4.9	2,386	10.3	6.9	1,581	6.8	4.9	528	4.5	3.2
民國102年	2,694	11.5	8.2	1,798	7.7	5.2	2,241	9.6	6.2	1,660	7.1	5.0	558	4.8	3.3
民國103年	2,717	11.6	8.1	1,890	8.1	5.3	2,350	10.0	6.3	1,791	7.7	5.2	548	4.7	3.1
民國104年	2,667	11.4	7.8	1,948	8.3	5.3	2,326	9.9	6.1	1,807	7.7	5.1	529	4.5	3.0
民國105年	2,936	12.5	8.3	1,996	8.5	5.3	2,315	9.8	5.8	1,731	7.4	4.8	656	5.6	3.6
民國106年	2,842	12.1	7.8	2,082	8.8	5.3	2,304	9.8	5.6	1,797	7.6	4.8	644	5.4	3.4
民國107年	3,027	12.8	8.1	2,292	9.7	5.6	2,299	9.7	5.5	1,929	8.2	5.1	624	5.3	3.2

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表4 歷年主要癌症死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年 別	非何杰金氏淋巴瘤			子宮頸及部位未明示子宮癌			白血病			膀胱癌			子宮體癌		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	925	4.0	3.2	747	6.6	4.9	907	3.9	3.3	737	3.2	2.4	172	1.5	1.2
民國98年	939	4.1	3.1	691	6.0	4.4	954	4.1	3.4	809	3.5	2.5	156	1.4	1.0
民國99年	1,018	4.4	3.2	741	6.4	4.6	1,000	4.3	3.4	786	3.4	2.4	196	1.7	1.3
民國100年	997	4.3	3.1	716	6.2	4.2	902	3.9	3.1	845	3.6	2.5	206	1.8	1.3
民國101年	1,043	4.5	3.1	704	6.1	4.1	975	4.2	3.2	863	3.7	2.4	201	1.7	1.2
民國102年	1,099	4.7	3.2	739	6.3	4.1	1,015	4.3	3.3	891	3.8	2.4	259	2.2	1.5
民國103年	1,138	4.9	3.2	673	5.7	3.6	1,021	4.4	3.2	940	4.0	2.4	297	2.5	1.7
民國104年	1,221	5.2	3.3	695	5.9	3.6	1,083	4.6	3.2	965	4.1	2.4	268	2.3	1.5
民國105年	1,203	5.1	3.2	667	5.7	3.4	1,130	4.8	3.3	957	4.1	2.3	332	2.8	1.8
民國106年	1,224	5.2	3.2	685	5.8	3.4	1,042	4.4	3.0	1,039	4.4	2.4	344	2.9	1.8
民國107年	1,207	5.1	3.0	687	5.8	3.4	1,132	4.8	3.2	1,071	4.5	2.4	409	3.4	2.1
民國108年	1,275	5.4	3.0	674	5.7	3.2	1,123	4.8	3.0	1,086	4.6	2.3	392	3.3	1.9
民國109年	1,294	5.5	3.0	668	5.6	3.1	1,176	5.0	3.0	1,065	4.5	2.2	444	3.7	2.2
民國110年	1,348	5.7	3.1	608	5.1	2.8	1,150	4.9	2.9	1,129	4.8	2.3	489	4.1	2.3
轉換比值	1.0272	1.0272	1.0255	1.0521	1.0521	1.0448	1.0328	1.0328	1.0303	1.0699	1.0699	1.0691	1.0354	1.0354	1.0378
原發布數															
民國97年	900	3.9	3.1	710	6.2	4.7	878	3.8	3.2	689	3.0	2.2	166	1.5	1.2
民國98年	914	4.0	3.0	657	5.7	4.2	924	4.0	3.3	756	3.3	2.4	151	1.3	1.0
民國99年	991	4.3	3.2	704	6.1	4.4	968	4.2	3.3	735	3.2	2.2	189	1.6	1.2
民國100年	971	4.2	3.0	681	5.9	4.1	873	3.8	3.0	790	3.4	2.3	199	1.7	1.3
民國101年	1,015	4.4	3.0	669	5.8	3.9	944	4.1	3.1	807	3.5	2.3	194	1.7	1.2
民國102年	1,070	4.6	3.1	702	6.0	4.0	983	4.2	3.2	833	3.6	2.2	250	2.1	1.5
民國103年	1,108	4.7	3.1	640	5.5	3.4	989	4.2	3.1	879	3.8	2.3	287	2.5	1.6
民國104年	1,189	5.1	3.2	661	5.6	3.5	1,049	4.5	3.1	902	3.8	2.2	259	2.2	1.4
民國105年	1,171	5.0	3.1	634	5.4	3.3	1,094	4.7	3.2	894	3.8	2.2	321	2.7	1.7
民國106年	1,192	5.1	3.1	651	5.5	3.2	1,009	4.3	2.9	971	4.1	2.2	332	2.8	1.7
民國107年	1,175	5.0	2.9	653	5.5	3.2	1,096	4.6	3.1	1,001	4.2	2.2	395	3.3	2.0

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表5 歷年男性主要癌症死亡原因

單位：人、每十萬人口

年 別	氣管、支氣管和肺癌			肝和肝內膽管癌			結腸、直腸和肛門癌			口腔癌			食道癌		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	5,354	46.1	36.8	5,531	47.6	39.6	2,605	22.4	17.9	2,253	19.4	16.0	1,393	12.0	9.8
民國98年	5,384	46.3	35.8	5,515	47.4	38.3	2,691	23.1	18.1	2,279	19.6	15.8	1,445	12.4	9.9
民國99年	5,461	46.9	35.4	5,502	47.3	37.1	2,856	24.5	18.4	2,382	20.5	16.1	1,537	13.2	10.3
民國100年	5,791	49.8	36.6	5,683	48.8	37.3	3,020	25.9	19.1	2,502	21.5	16.5	1,493	12.8	9.7
民國101年	5,678	48.7	35.0	5,645	48.4	36.1	3,105	26.6	19.0	2,557	21.9	16.5	1,559	13.4	9.9
民國102年	5,764	49.4	34.5	5,699	48.8	35.2	3,223	27.6	19.3	2,715	23.2	17.0	1,623	13.9	10.0
民國103年	5,946	50.9	34.7	5,603	47.9	33.9	3,317	28.4	19.3	2,713	23.2	16.9	1,770	15.1	10.7
民國104年	5,937	50.7	33.8	5,635	48.1	33.2	3,374	28.8	19.0	2,650	22.6	16.0	1,773	15.1	10.5
民國105年	6,014	51.3	33.4	5,668	48.4	32.3	3,453	29.5	19.0	2,926	25.0	17.2	1,709	14.6	9.9
民國106年	5,889	50.3	31.8	5,800	49.5	32.0	3,464	29.6	18.5	2,865	24.4	16.4	1,751	14.9	9.8
民國107年	5,966	50.9	31.4	5,625	48.0	30.3	3,508	29.9	18.3	3,012	25.7	16.9	1,891	16.1	10.4
民國108年	6,190	52.9	31.6	5,363	45.8	28.1	3,661	31.3	18.6	3,154	26.9	17.3	1,841	15.7	9.9
民國109年	6,037	51.6	29.7	5,296	45.3	26.8	3,636	31.1	17.9	3,137	26.8	16.8	1,801	15.4	9.5
民國110年	6,335	54.5	30.7	5,411	46.5	26.8	3,816	32.8	18.4	3,110	26.7	16.5	1,869	16.1	9.7
轉換比值	1.0090	1.0090	1.0086	1.0088	1.0088	1.0084	1.0503	1.0503	1.0498	1.0838	1.0838	1.0837	1.0552	1.0552	1.0542
原發布數															
民國97年	5,306	45.7	36.5	5,483	47.2	39.3	2,480	21.3	17.0	2,079	17.9	14.8	1,320	11.4	9.3
民國98年	5,336	45.9	35.5	5,467	47.0	38.0	2,562	22.0	17.2	2,103	18.1	14.6	1,369	11.8	9.4
民國99年	5,412	46.5	35.1	5,454	46.9	36.8	2,719	23.4	17.6	2,198	18.9	14.9	1,457	12.5	9.7
民國100年	5,740	49.3	36.3	5,633	48.4	37.0	2,875	24.7	18.2	2,308	19.8	15.2	1,415	12.2	9.2
民國101年	5,628	48.3	34.7	5,596	48.0	35.8	2,956	25.4	18.1	2,359	20.2	15.3	1,477	12.7	9.4
民國102年	5,713	48.9	34.2	5,649	48.4	34.9	3,069	26.3	18.3	2,505	21.4	15.7	1,538	13.2	9.5
民國103年	5,893	50.4	34.4	5,554	47.5	33.6	3,158	27.0	18.4	2,503	21.4	15.6	1,677	14.3	10.1
民國104年	5,884	50.3	33.5	5,586	47.7	32.9	3,212	27.4	18.1	2,445	20.9	14.8	1,680	14.4	9.9
民國105年	5,961	50.9	33.2	5,619	48.0	32.1	3,288	28.1	18.1	2,700	23.0	15.9	1,620	13.8	9.3
民國106年	5,837	49.8	31.6	5,749	49.1	31.8	3,298	28.1	17.6	2,643	22.6	15.2	1,659	14.2	9.3
民國107年	5,913	50.5	31.1	5,576	47.6	30.0	3,340	28.5	17.4	2,779	23.7	15.6	1,792	15.3	9.9

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表5 歷年男性主要癌症死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年 別	前列腺(攝護腺)癌			胰臟癌			胃癌			膀胱癌			非何杰金氏淋巴瘤		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	942	8.1	6.1	806	6.9	5.7	1,590	13.7	10.7	502	4.3	3.3	575	4.9	4.0
民國98年	988	8.5	6.2	885	7.6	6.0	1,529	13.1	9.9	523	4.5	3.4	558	4.8	3.8
民國99年	1,078	9.3	6.5	869	7.5	5.7	1,517	13.0	9.6	538	4.6	3.3	647	5.6	4.2
民國100年	1,157	9.9	6.8	922	7.9	5.8	1,555	13.4	9.5	559	4.8	3.4	631	5.4	4.0
民國101年	1,253	10.7	7.1	950	8.2	5.9	1,576	13.5	9.4	562	4.8	3.2	623	5.3	3.8
民國102年	1,274	10.9	7.0	1,026	8.8	6.3	1,490	12.8	8.6	596	5.1	3.4	640	5.5	3.8
民國103年	1,286	11.0	6.8	1,030	8.8	6.1	1,611	13.8	9.0	638	5.5	3.5	678	5.8	4.0
民國104年	1,300	11.1	6.7	1,104	9.4	6.4	1,530	13.1	8.4	645	5.5	3.4	738	6.3	4.2
民國105年	1,422	12.1	7.2	1,125	9.6	6.4	1,491	12.7	8.0	635	5.4	3.3	712	6.1	4.0
民國106年	1,470	12.5	7.3	1,158	9.9	6.4	1,529	13.0	7.9	678	5.8	3.4	730	6.2	4.0
民國107年	1,454	12.4	7.0	1,240	10.6	6.6	1,453	12.4	7.4	704	6.0	3.5	718	6.1	3.9
民國108年	1,538	13.1	7.1	1,360	11.6	7.0	1,436	12.3	7.2	711	6.1	3.4	735	6.3	3.8
民國109年	1,730	14.8	7.8	1,349	11.5	6.8	1,433	12.3	6.9	712	6.1	3.3	748	6.4	3.8
民國110年	1,689	14.5	7.5	1,442	12.4	7.1	1,419	12.2	6.7	761	6.5	3.5	754	6.5	3.7
轉換比值	1.0559	1.0559	1.0544	1.0164	1.0164	1.0159	1.0491	1.0491	1.0458	1.0683	1.0683	1.0645	1.0301	1.0301	1.0247
原發布數															
民國97年	892	7.7	5.7	793	6.8	5.6	1,516	13.0	10.2	470	4.0	3.1	558	4.8	3.9
民國98年	936	8.0	5.9	871	7.5	5.9	1,457	12.5	9.5	490	4.2	3.2	542	4.7	3.7
民國99年	1,021	8.8	6.1	855	7.3	5.6	1,446	12.4	9.2	504	4.3	3.1	628	5.4	4.1
民國100年	1,096	9.4	6.4	907	7.8	5.7	1,482	12.7	9.1	523	4.5	3.2	613	5.3	4.0
民國101年	1,187	10.2	6.7	935	8.0	5.8	1,502	12.9	9.0	526	4.5	3.1	605	5.2	3.7
民國102年	1,207	10.3	6.6	1,009	8.6	6.2	1,420	12.2	8.3	558	4.8	3.2	621	5.3	3.7
民國103年	1,218	10.4	6.5	1,013	8.7	6.0	1,536	13.1	8.6	597	5.1	3.3	658	5.6	3.9
民國104年	1,231	10.5	6.4	1,086	9.3	6.3	1,458	12.5	8.0	604	5.2	3.2	716	6.1	4.1
民國105年	1,347	11.5	6.8	1,107	9.4	6.3	1,421	12.1	7.6	594	5.1	3.1	691	5.9	3.9
民國106年	1,392	11.9	6.9	1,139	9.7	6.3	1,457	12.4	7.6	635	5.4	3.2	709	6.0	3.9
民國107年	1,377	11.8	6.6	1,220	10.4	6.5	1,385	11.8	7.1	659	5.6	3.3	697	5.9	3.8

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表5 歷年男性主要癌症死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年 別	白血病			鼻咽癌			腎臟癌			腦癌			膽囊和其他膽道癌		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	528	4.5	3.9	620	5.3	4.4	275	2.4	1.9	233	2.0	1.7	308	2.6	2.2
民國98年	589	5.1	4.2	555	4.8	3.9	303	2.6	2.0	260	2.2	2.0	331	2.8	2.2
民國99年	600	5.2	4.2	533	4.6	3.7	302	2.6	1.9	289	2.5	2.1	290	2.5	1.9
民國100年	552	4.7	3.8	602	5.2	4.0	322	2.8	2.0	299	2.6	2.2	306	2.6	2.0
民國101年	598	5.1	4.0	547	4.7	3.5	307	2.6	1.9	286	2.4	2.0	271	2.3	1.7
民國102年	601	5.1	3.9	563	4.8	3.6	320	2.7	2.0	318	2.7	2.1	292	2.5	1.7
民國103年	577	4.9	3.7	563	4.8	3.5	306	2.6	1.8	314	2.7	2.2	300	2.6	1.8
民國104年	639	5.5	4.0	640	5.5	3.9	301	2.6	1.7	310	2.6	2.1	336	2.9	1.9
民國105年	645	5.5	3.8	562	4.8	3.4	368	3.1	2.1	318	2.7	2.1	294	2.5	1.6
民國106年	614	5.2	3.7	516	4.4	3.0	341	2.9	1.8	336	2.9	2.1	291	2.5	1.6
民國107年	656	5.6	4.0	532	4.5	3.0	396	3.4	2.1	336	2.9	2.1	285	2.4	1.5
民國108年	653	5.6	3.7	536	4.6	3.0	379	3.2	1.9	363	3.1	2.2	339	2.9	1.7
民國109年	717	6.1	3.9	487	4.2	2.6	334	2.9	1.7	360	3.1	2.1	312	2.7	1.6
民國110年	678	5.8	3.7	522	4.5	2.8	355	3.1	1.7	319	2.7	1.9	313	2.7	1.5
轉換比值	1.0314	1.0314	1.0299	1.0556	1.0556	1.0547	1.0449	1.0449	1.0413	1.0090	1.0090	1.0037	1.0252	1.0252	1.0290
原發布數															
民國97年	512	4.4	3.8	587	5.1	4.2	263	2.3	1.8	231	2.0	1.7	300	2.6	2.1
民國98年	571	4.9	4.1	526	4.5	3.7	290	2.5	2.0	258	2.2	2.0	323	2.8	2.2
民國99年	582	5.0	4.1	505	4.3	3.5	289	2.5	1.9	286	2.5	2.1	283	2.4	1.8
民國100年	535	4.6	3.7	570	4.9	3.8	308	2.6	1.9	296	2.5	2.2	298	2.6	1.9
民國101年	580	5.0	3.9	518	4.4	3.4	294	2.5	1.8	283	2.4	2.0	264	2.3	1.7
民國102年	583	5.0	3.8	533	4.6	3.4	306	2.6	1.9	315	2.7	2.1	285	2.4	1.7
民國103年	559	4.8	3.6	533	4.6	3.3	293	2.5	1.7	311	2.7	2.2	293	2.5	1.7
民國104年	620	5.3	3.9	606	5.2	3.7	288	2.5	1.7	307	2.6	2.1	328	2.8	1.9
民國105年	625	5.3	3.7	532	4.5	3.2	352	3.0	2.0	315	2.7	2.1	287	2.4	1.5
民國106年	595	5.1	3.6	489	4.2	2.9	326	2.8	1.7	333	2.8	2.1	284	2.4	1.5
民國107年	636	5.4	3.8	504	4.3	2.9	379	3.2	2.0	333	2.8	2.1	278	2.4	1.4

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表6 歷年女性主要癌症死亡原因

單位：人、每十萬人口

年 別	氣管、支氣管和肺癌			女性乳癌			結腸、直腸和肛門癌			肝和肝內膽管癌			胰臟癌		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	2,496	21.9	16.7	1,600	14.1	11.1	1,861	16.4	12.3	2,190	19.2	14.9	581	5.1	3.9
民國98年	2,642	23.1	17.0	1,650	14.4	11.0	2,052	17.9	13.0	2,315	20.2	15.0	620	5.4	4.0
民國99年	2,810	24.4	17.2	1,772	15.4	11.4	2,039	17.7	12.4	2,313	20.1	14.3	626	5.4	3.9
民國100年	2,830	24.5	16.7	1,923	16.6	12.0	2,132	18.5	12.4	2,412	20.9	14.4	712	6.2	4.2
民國101年	2,989	25.7	17.1	1,986	17.1	12.0	2,267	19.5	12.5	2,545	21.9	14.5	707	6.1	4.0
民國102年	3,173	27.2	17.5	2,037	17.5	12.0	2,289	19.6	12.3	2,593	22.2	14.2	803	6.9	4.4
民國103年	3,307	28.2	17.5	2,151	18.4	12.4	2,549	21.8	13.1	2,650	22.6	13.9	892	7.6	4.7
民國104年	3,382	28.8	17.2	2,223	18.9	12.5	2,580	21.9	12.7	2,698	22.9	13.6	877	7.5	4.4
民國105年	3,446	29.2	16.9	2,260	19.1	12.2	2,537	21.5	12.0	2,761	23.4	13.3	905	7.7	4.4
民國106年	3,433	29.0	16.0	2,468	20.9	13.0	2,620	22.1	12.0	2,679	22.6	12.4	959	8.1	4.5
民國107年	3,510	29.6	15.9	2,511	21.2	12.9	2,588	21.8	11.5	2,672	22.5	11.7	1,091	9.2	4.9
民國108年	3,511	29.5	15.3	2,633	22.2	13.1	2,775	23.3	11.8	2,518	21.2	10.5	1,137	9.6	5.0
民國109年	3,592	30.2	15.1	2,655	22.3	12.8	2,853	24.0	11.8	2,477	20.8	10.0	1,101	9.3	4.7
民國110年	3,705	31.3	15.0	2,913	24.6	13.8	2,841	24.0	11.3	2,559	21.6	10.0	1,217	10.3	5.0
轉換比值	1.0101	1.0101	1.0097	1.0385	1.0385	1.0368	1.0423	1.0423	1.0393	1.0098	1.0098	1.0095	1.0177	1.0177	1.0160
原發布數															
民國97年	2,471	21.7	16.5	1,541	13.5	10.7	1,786	15.7	11.8	2,168	19.1	14.7	571	5.0	3.8
民國98年	2,615	22.8	16.9	1,589	13.9	10.6	1,969	17.2	12.5	2,292	20.0	14.9	609	5.3	3.9
民國99年	2,782	24.2	17.1	1,706	14.8	11.0	1,957	17.0	11.9	2,290	19.9	14.2	615	5.3	3.8
民國100年	2,801	24.2	16.5	1,852	16.0	11.6	2,046	17.7	11.9	2,389	20.7	14.3	700	6.1	4.1
民國101年	2,959	25.5	17.0	1,912	16.5	11.6	2,175	18.7	12.1	2,520	21.7	14.4	694	6.0	4.0
民國102年	3,141	26.9	17.3	1,962	16.8	11.6	2,196	18.8	11.9	2,568	22.0	14.1	789	6.8	4.3
民國103年	3,274	28.0	17.3	2,071	17.7	11.9	2,445	20.9	12.6	2,624	22.4	13.8	877	7.5	4.6
民國104年	3,348	28.5	17.0	2,141	18.2	12.0	2,475	21.0	12.2	2,672	22.7	13.4	862	7.3	4.4
民國105年	3,411	28.9	16.7	2,176	18.4	11.8	2,434	20.6	11.6	2,734	23.2	13.2	889	7.5	4.3
民國106年	3,398	28.7	15.9	2,377	20.1	12.6	2,514	21.2	11.6	2,653	22.4	12.3	943	8.0	4.4
民國107年	3,475	29.3	15.7	2,418	20.4	12.5	2,483	20.9	11.0	2,646	22.3	11.6	1,072	9.0	4.8

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表6 歷年女性主要癌症死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年 別	胃癌			卵巢癌			子宮頸及部位未明示子宮癌			非何杰金氏淋巴瘤			子宮體癌		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	798	7.0	5.3	427	3.8	3.0	747	6.6	4.9	350	3.1	2.4	172	1.5	1.2
民國98年	848	7.4	5.3	452	3.9	3.0	691	6.0	4.4	381	3.3	2.5	156	1.4	1.0
民國99年	838	7.3	5.1	448	3.9	2.9	741	6.4	4.6	371	3.2	2.3	196	1.7	1.3
民國100年	829	7.2	4.8	459	4.0	2.9	716	6.2	4.2	366	3.2	2.2	206	1.8	1.3
民國101年	910	7.8	5.1	545	4.7	3.3	704	6.1	4.1	420	3.6	2.5	201	1.7	1.2
民國102年	845	7.3	4.5	576	4.9	3.4	739	6.3	4.1	459	3.9	2.6	259	2.2	1.5
民國103年	837	7.2	4.4	566	4.8	3.2	673	5.7	3.6	460	3.9	2.5	297	2.5	1.7
民國104年	893	7.6	4.4	546	4.6	3.0	695	5.9	3.6	483	4.1	2.5	268	2.3	1.5
民國105年	921	7.8	4.4	677	5.7	3.7	667	5.7	3.4	491	4.2	2.5	332	2.8	1.8
民國106年	871	7.4	4.1	665	5.6	3.5	685	5.8	3.4	494	4.2	2.4	344	2.9	1.8
民國107年	942	7.9	4.2	644	5.4	3.3	687	5.8	3.4	489	4.1	2.2	409	3.4	2.1
民國108年	943	7.9	4.0	683	5.7	3.5	674	5.7	3.2	540	4.5	2.3	392	3.3	1.9
民國109年	906	7.6	3.8	724	6.1	3.6	668	5.6	3.1	546	4.6	2.3	444	3.7	2.2
民國110年	891	7.5	3.6	696	5.9	3.3	608	5.1	2.8	594	5.0	2.5	489	4.1	2.3
轉換比值	1.0306	1.0306	1.0284	1.0321	1.0321	1.0303	1.0521	1.0521	1.0448	1.0230	1.0230	1.0286	1.0354	1.0354	1.0378
原發布數															
民國97年	776	6.8	5.1	414	3.6	2.9	710	6.2	4.7	342	3.0	2.3	166	1.5	1.2
民國98年	825	7.2	5.2	438	3.8	2.9	657	5.7	4.2	372	3.2	2.4	151	1.3	1.0
民國99年	815	7.1	4.9	434	3.8	2.8	704	6.1	4.4	363	3.2	2.2	189	1.6	1.2
民國100年	806	7.0	4.7	445	3.9	2.8	681	5.9	4.1	358	3.1	2.1	199	1.7	1.3
民國101年	884	7.6	5.0	528	4.5	3.2	669	5.8	3.9	410	3.5	2.4	194	1.7	1.2
民國102年	821	7.0	4.4	558	4.8	3.3	702	6.0	4.0	449	3.8	2.5	250	2.1	1.5
民國103年	814	6.9	4.3	548	4.7	3.1	640	5.5	3.4	450	3.8	2.4	287	2.5	1.6
民國104年	868	7.4	4.3	529	4.5	3.0	661	5.6	3.5	473	4.0	2.5	259	2.2	1.4
民國105年	894	7.6	4.3	656	5.6	3.6	634	5.4	3.3	480	4.1	2.4	321	2.7	1.7
民國106年	847	7.2	3.9	644	5.4	3.4	651	5.5	3.2	483	4.1	2.4	332	2.8	1.7
民國107年	914	7.7	4.1	624	5.3	3.2	653	5.5	3.2	478	4.0	2.1	395	3.3	2.0

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表6 歷年女性主要癌症死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年 別	白血病			膀胱癌			膽囊和其他膽道癌			口腔癌			腦癌		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	379	3.3	2.8	235	2.1	1.5	253	2.2	1.7	150	1.3	1.0	149	1.3	1.2
民國98年	365	3.2	2.6	286	2.5	1.8	305	2.7	1.9	157	1.4	1.0	196	1.7	1.4
民國99年	400	3.5	2.7	248	2.2	1.5	252	2.2	1.6	185	1.6	1.2	213	1.9	1.6
民國100年	350	3.0	2.3	286	2.5	1.7	256	2.2	1.5	166	1.4	1.0	218	1.9	1.6
民國101年	377	3.2	2.5	301	2.6	1.6	304	2.6	1.7	223	1.9	1.3	209	1.8	1.5
民國102年	414	3.5	2.7	295	2.5	1.5	262	2.2	1.4	203	1.7	1.2	224	1.9	1.5
民國103年	444	3.8	2.7	302	2.6	1.5	280	2.4	1.5	230	2.0	1.2	252	2.2	1.7
民國104年	444	3.8	2.5	320	2.7	1.5	299	2.5	1.5	239	2.0	1.2	243	2.1	1.5
民國105年	485	4.1	2.8	322	2.7	1.5	287	2.4	1.4	254	2.2	1.3	243	2.1	1.5
民國106年	428	3.6	2.3	361	3.0	1.5	295	2.5	1.4	214	1.8	1.1	241	2.0	1.4
民國107年	476	4.0	2.5	367	3.1	1.5	278	2.3	1.2	267	2.3	1.3	277	2.3	1.6
民國108年	470	4.0	2.3	375	3.2	1.5	278	2.3	1.2	271	2.3	1.2	278	2.3	1.7
民國109年	459	3.9	2.2	353	3.0	1.3	314	2.6	1.3	243	2.0	1.1	270	2.3	1.4
民國110年	472	4.0	2.3	368	3.1	1.3	307	2.6	1.2	285	2.4	1.2	270	2.3	1.5
轉換比值	1.0348	1.0348	1.0316	1.0731	1.0731	1.0767	1.0221	1.0221	1.0231	1.0766	1.0766	1.0794	0.9928	0.9928	0.9972
原發布數															
民國97年	366	3.2	2.7	219	1.9	1.4	248	2.2	1.7	139	1.2	0.9	150	1.3	1.2
民國98年	353	3.1	2.5	266	2.3	1.6	298	2.6	1.9	146	1.3	0.9	197	1.7	1.4
民國99年	386	3.4	2.7	231	2.0	1.4	246	2.1	1.5	172	1.5	1.1	215	1.9	1.6
民國100年	338	2.9	2.2	267	2.3	1.5	251	2.2	1.5	155	1.3	0.9	220	1.9	1.6
民國101年	364	3.1	2.4	281	2.4	1.5	298	2.6	1.7	207	1.8	1.2	211	1.8	1.5
民國102年	400	3.4	2.6	275	2.4	1.4	256	2.2	1.4	189	1.6	1.1	226	1.9	1.5
民國103年	430	3.7	2.6	282	2.4	1.4	274	2.3	1.4	214	1.8	1.1	254	2.2	1.7
民國104年	429	3.6	2.4	298	2.5	1.4	292	2.5	1.4	222	1.9	1.1	245	2.1	1.5
民國105年	469	4.0	2.7	300	2.5	1.3	281	2.4	1.4	236	2.0	1.2	245	2.1	1.5
民國106年	414	3.5	2.3	336	2.8	1.4	288	2.4	1.3	199	1.7	1.0	243	2.1	1.4
民國107年	460	3.9	2.4	342	2.9	1.4	272	2.3	1.2	248	2.1	1.2	279	2.4	1.6

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。