

# 倍拉維 Paxlovid™ 經管灌給藥配置建議

## ⚠️ 管灌之準備及注意事項



- 鼻胃管尺寸與材質：使用 8FR 或更大管徑；PVC、silicone 或 polyurethane
- 需準備 20 ml 空針（針筒 A、針筒 B）



兩種藥物 (Nirmatrelvir、Ritonavir) 需 **分開** 製備懸浮液，並間隔 **5 分鐘內** 服用



懸浮液在室溫下可保存 **4 小時**，勿超過此保存時間



管灌 Paxlovid (Nirmatrelvir/Ritonavir) 前後至少 **2 小時禁食** 任何食物

## ⚠️ 管灌步驟

1

## 2 懸浮液準備

## 3 管灌與沖洗殘餘劑量





Nirmatrelvir 150 mg (粉紅錠劑 2 錠)



Ritonavir 100 mg (白色錠劑 1 錠)

錠劑加入  
磨粉加入



針筒皆按照以下步驟執行：

1. 融於水 10 ml  
吸取空氣至 15 ml
2. 上下搖晃 15 秒、  
靜置 3 分鐘以利分解

⚠️ 兩者藥物勿混合，前後給藥間隔 5 分鐘內

1. 搖晃 1 分鐘，均勻混合
2. 給藥後，吸取 10 ml 水並上下搖晃 15 秒，將殘藥給予完全且將鼻胃管沖洗乾淨

Reference: Pfizer data on file

免責聲明：利用懸浮液管灌給予病患 Paxlovid™ 的效用並未在臨床試驗中評估，也未有相關藥物動力學研究。Paxlovid™ 中文說明書中並不推薦該方式給予藥物。

2024/06/27