



NP-22-2

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

衛生福利部 113 年度專科護理師甄審筆試試題本

報考科別：婦產科

科目：進階專科護理

【注意事項】

- 1.請核對考試科目與報考類別是否相符。
- 2.請檢查答案卡、座位及入場證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
- 3.本試卷共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。試卷最後一題後面有備註【以下空白】。
- 4.本試卷均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 **2B** 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
- 5.有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
- 6.本試卷空白處或背面，可做草稿使用。
- 7.請在試卷首頁入場證號碼之方格內，填上自己的入場證號碼，考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。


入場證號碼：

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫入場證號碼，再翻閱試題本作答。

1. 下列何者為登革熱感染常見之抽血檢查結果？

- (A) 白血球增加 (B) 血小板減少
(C) 血清白蛋白上升 (D) 紅血球沉降速率下降

2. 下列何者最可能是高血鉀病人的心電圖(lead II)？



3. 低血鈉除了評估病人的體液狀態外，主要還可以用哪3項檢驗數據來協助鑑別診斷？

- ① 尿液鈉離子濃度 ② 尿液滲透壓 ③ 血清鉀離子濃度 ④ 血清滲透壓
(A) ①②③ (B) ②③④ (C) ①②④ (D) ①③④

4. 35歲男性病人，昨天剛入院，主訴發燒和疲勞已超過4週，體溫多次超過 38.3°C ，絕對嗜中性白血球數目 $250/\text{mm}^3$ ，之前曾看過2次門診，仍無法確認發燒原因，血液培養為陰性。病人最有可能是下列何種不明原因發燒(fever of unknown origin, FUO)？

- (A) neutropenic FUO (B) hospital-associated FUO
(C) HIV-associated FUO (D) viral infection FUO

5. 關於體溫過高的敘述，下列何者正確？

- (A) 體溫至 39°C 可定義為hyperpyrexia
(B) 體溫超過 41.5°C 常見於中樞神經系統出血病人
(C) 發燒可透過肌肉和腎臟的代謝活動散熱
(D) acetaminophen可緩解熱急症(heat stroke)之高燒

6. 65歲男性病人，有慢性胃炎和血小板低下病史，此次因上呼吸道感染引起發燒前來就診，體溫達到 38.5°C 。下列何種退燒藥物較合適？

- (A) aspirin (B) acetaminophen (C) ibuprofen (D) naproxen

7. 40歲男性病人，主訴持續性頭痛、發燒及頸部僵硬已持續2天，腦脊髓液檢查結果為外觀混濁、壓力 280mmHg (正常參考值 $70-180\text{mmHg}$)、白血球計數 $10000/\text{mm}^3$ 且以多核球為主(正常參考值 $0-5$ 淋巴球/ mm^3)、葡萄糖 20mg/dL (正常參考值 $45-85\text{mg/dL}$)、蛋白質 180mg/dL (正常參考值 $15-45\text{mg/dL}$)、血糖值正常。其最可能的診斷為何？

- (A) bacterial meningitis (B) tuberculous meningitis
(C) fungal meningitis (D) viral meningitis

8. 接受副甲狀腺切除術後，出現Chvostek's sign及Trousseau's sign的主要因為下列何者？

- (A) 低血鉀 (B) 高血鉀 (C) 低血鈣 (D) 高血鈣

9. 23歲女性因嘔吐及呼吸急促被送至急診，到院時初始血壓 $90/48\text{mmHg}$ 、脈搏135次/分、 SpO_2 97%、血糖 585mg/dL 、血鈉 124mEq/L 、血鉀 4.6mEq/L 、動脈血液氣體分析為pH值7.14、 PaCO_2 22mmHg 、 HCO_3^- 8mmol/L 。下列評估或處置何者正確？

- (A) 若病人在一般病房住院治療，應嚴密的監測與追蹤
(B) 若該病人為糖尿病酮酸血症，則其動脈血之anion gap應正常
(C) 此病人的治療應常規給予normal saline、regular insulin及 NaHCO_3
(D) 當病人血糖經胰島素輸注治療後降到 $250-300\text{mg/dL}$ 時，應立即停止輸注胰島素

10. 癌症病人使用 fentanyl 貼片，主要透過何種機制產生止痛作用？
- (A) 抑制神經細胞的鈉離子通道，降低神經興奮性
 (B) 阻斷神經肌肉接受器的乙醯膽鹼釋放
 (C) 刺激 GABA 受體，增加抑制性神經傳導
 (D) 作用於中樞 μ -鴉片受體，產生鎮痛效果
11. 為安寧緩和醫療的病人進行身體評估時，下列敘述何者正確？
- (A) 喉頭持續出現「咕嚕」聲，是因喉頭肌肉鬆弛，無法有效吞口水
 (B) 以 PAIN 評估整體痛，「N」指的是 non-pharmacological management
 (C) 一般情況下，腹水超過 300 mL 才能由超音波檢測出
 (D) 陳施氏呼吸型態 (Cheyne-Stokes) 是呼吸淺快，之後逐漸變慢加深，又逐漸變淺快
12. 68 歲末期癌症病人經常抱怨骨頭痛及神經性疼痛，夜間出現間歇性疼痛，疼痛指數由 4 分加劇到 8 分。下列何種輔助止痛藥物對此病人最合適？
- (A) 三環類抗憂鬱藥 (tricyclic antidepressants)
 (B) 降鈣素 (calcitonin)
 (C) 抗癲癇藥 (anticonvulsants)
 (D) 類固醇 (corticosteroids)
13. 80 歲女性為長期糖尿病、高血壓及中風不良於行之病人，因急性腹痛來急診就醫，其平躺之腹部 X 光如圖(一)，另一張左側躺之腹部 X 光檢查如圖(二)，下列敘述何者正確？



圖(一)



圖(二)

- (A) 推測有腹腔積水，可能為腹腔腫瘤導致
 (B) 推測有腹部脹氣，可能為腸阻塞導致
 (C) 推測有腹腔積氣，可能為腹腔內中空臟器破裂導致
 (D) 為正常腹部影像，只須持續追蹤
14. 68 歲男性肺癌病人化學治療後第 2 天上午出現劇烈嘔吐，當晚主訴左胸疼痛，胸部 X 光疑似左側肋膜積液，胸腔穿刺引流液檢查為 WBC $1500/\text{mm}^3$ (lymphocyte 8%、neutrophil 80%)、LDH 270 U/L、glucose 40 mg/dL、amylase 380 U/L。下列處置何者最適當？
- (A) 給予抗結核藥物治療
 (B) 胸水引流與禁食
 (C) 給予舌下 NTG 服用緩解疼痛
 (D) 給予利尿劑緩解肋膜積液
15. 關於急性冠心症的實驗室檢驗，下列敘述何者最不適當？
- (A) troponin T 對偵測心肌細胞壞死具有高度的敏感度與特異度
 (B) CK-MB 是作為初步診斷 NSTEMI 的良好檢測指標
 (C) 在急性冠心症的病人 BNP 的升高與較差的臨床預後相關
 (D) CK-MB 可用於追蹤偵測心肌梗塞後的再發性心肌缺血

16. 圖(三)顯示的心電圖波形是何種心律不整？



圖(三)

- (A) 一度房室傳導阻滯 (first degree AV block)
(B) Mobitz type I 二度房室傳導阻滯 (second degree AV block)
(C) Mobitz type II 二度房室傳導阻滯 (second degree AV block)
(D) 完全房室傳導阻滯 (complete AV block)
17. 28 歲女性患有第 1 型糖尿病，懷孕 28 週，因為持續嘔吐被送到急診，生命徵象穩定，抽血檢查血糖 200 mg/dL，動脈血液氣體分析結果為 pH 值 6.9、 HCO_3^- 12 mmol/L，血清酮體 (ketone body) 8 mmol/L。下列評估與處置之敘述何者最適當？
(A) 血糖值小於 300 mg/dL，可排除是酮酸中毒
(B) 第三產期孕婦糖尿病酮酸中毒應該立刻引產
(C) 孕婦糖尿病酮酸中毒不可矯正 pH 值
(D) 孕婦糖尿病酮酸中毒的胰島素治療原則與非孕婦無異
18. 關於肝功能的實驗室檢驗，下列敘述何者正確？
① α -fetoprotein 是由胚胎肝細胞所產生，對肝細胞癌的敏感度及特異度很高 (90% 以上)
② 在溶血性貧血的病人膽色素 (bilirubin) 升高主要是以直接型 (direct) 膽色素為主
③ alkaline phosphatase (ALP) 除了在肝臟外，也可在腎臟、腸道及骨頭的組織中偵測到
④ aspartate aminotransferase (AST) 及 alanine aminotransferase (ALT) 在肝細胞損傷時均會升高，在橫紋肌溶解也可偵測到 AST 升高
(A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①④
19. 中年男性心悸入急診，脈搏 154 次/分、血壓 80/50 mmHg、呼吸 20 次/分、意識 E3M6V5，心電圖如圖(四)，下列處置何者正確？
- 
- 圖(四)
- (A) 病人心跳過快，應先給予靜脈注射乙型阻斷劑
(B) 心電圖為 PSVT，應先給予 adenosine 6 mg 快速靜脈推注
(C) 應先給予強心藥物 (inotropic agents)
(D) 應先進行雙向電擊器心臟同步整流 120 焦耳
20. 年輕男性跳水後頭部撞擊泳池底，意識清醒、前額擦傷、頸部疼痛、乳頭以下麻木無力，血壓 70/40 mmHg、心跳 40 次/分、呼吸 16 次/分，皮膚紅潤。其休克最可能的原因為何？
(A) 顱內腦幹位置出血抑制心血管系統 (B) 交感神經功能下降引起神經性休克
(C) 胸腔內出血造成低血容休克 (D) 溺水心肌缺氧導致心因性休克
21. 因車禍導致大腿骨開放性骨折而接受手術的病人，當醫師正在縫合傷口時，專科護理師發現病人血壓降到 65/40 mmHg、CVP 20 cmH₂O，EKG 呈現 ST elevation，經測量得心輸出量下降，全身性血管阻力 (SVR) 上升，其最可能的診斷為何？
(A) 敗血性休克 (B) 低血容性休克 (C) 心因性休克 (D) 過敏性休克
22. 心臟衰竭合併低血壓病人，使用下列何種升壓劑無法有效增加心輸出量？
(A) vasopressin (B) dobutamine (C) norepinephrine (D) dopamine

23. 疑似肺動脈栓塞病人，呼吸喘及胸悶且有休克現象，下列評估或處置之敘述何者正確？
(A) 使用血管加壓藥物是絕對禁忌症
(B) 不適合大量輸液，要謹慎評估體液情況
(C) 最可能是大面積肺栓塞造成的分佈性休克
(D) 血栓溶解劑及手術取栓都是可行的治療方式
24. 全家 4 人都一氧化碳中毒，何者最可能需要高壓氧治療？
(A) 50 歲父親，頭暈頭痛，COHb (carboxyhemoglobin) 10 %
(B) 78 歲祖母，全身無力、糖尿病史，COHb 18 %
(C) 25 歲女兒，懷孕 20 週，COHb 18 %
(D) 18 歲兒子，頭暈頭痛、全身無力，COHb 20 %
25. 一位婦女發現會陰和肛門區域有多個軟疣 (soft warts) 前來求診，最可能感染哪種病原體？
(A) 梅毒螺旋體 (B) 人類免疫缺乏病毒 (HIV)
(C) 人類乳突病毒 (HPV) (D) 陰道滴蟲
26. 發生經前症候群的頻率及嚴重程度最高，是下列哪一期？
(A) 黃體期晚期 (late luteal phase) (B) 濾泡期 (follicular phase)
(C) 增殖期 (proliferative phase) (D) 排卵期 (ovulatory phase)
27. 一位孕婦目前妊娠 28 週，她於 12 週初次產檢時 Hb 值為 12.8 g/dL，這次產檢為 12.4 g/dL。下列處置何者最適當？
(A) 抽血檢查 CBC 和血清儲鐵蛋白量
(B) 可能是腸胃功能不佳，將口服的鐵劑改為靜脈注射鐵劑
(C) 鼓勵她繼續攝取含鐵高的食物並持續補充鐵劑
(D) 詢問過去病史及家族史，確認是否有遺傳性貧血的風險
28. 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌最重要的危險因子，下列何者為致癌力強的高危險型別？
(A) 6,11 型 (B) 14,17 型 (C) 16,18 型 (D) 30,32 型
29. 一位孕婦主述皮膚出現不規則丘疹，沒有淋巴腫大壓痛情形。下列 hemagglutination inhibition (HAI) titer 數據中，何者可確認其不是感染德國麻疹？
(A) 1 : 8 (B) 1 : 128 (C) 1 : 64 (D) 1 : 72
30. 根據母血唐氏症篩檢風險值，用以建議是否進一步安排羊膜穿刺檢查。下列何者為高危險群？
(A) 1/250 (B) 1/570 (C) 1/980 (D) 1/1080
31. 「嬰兒外觀上有鼻樑塌陷、向上傾斜的臉裂及手指粗短等特徵，伴隨先天性心臟病及十二指腸閉鎖疾病。」，上述最可能是何種染色體異常疾病？
(A) 巴特氏症候群 (Patau syndrome) (B) 唐氏症候群 (Down syndrome)
(C) 艾德華氏症候群 (Edwards syndrome) (D) 透納氏症候群 (Turner syndrome)
32. 一對夫妻接受不孕症治療，太太雙側輸卵管阻塞，先生精子濃度 3×10^6 /mL，6% 精子具活動力，10% 精子屬正常型態，下列人工生殖科技治療方式何項最適當？
(A) 以配偶的精子進行人工受精 (AIH)
(B) 接受輸卵管內精卵植入術 (GIFT)
(C) 接受體外受精與胚胎植入術 (IVF/ET) 併卵質內精蟲注射 (ICSI)
(D) 接受輸卵管胚胎植入術 (IVF/TET)

33. 妊娠 38 週合併妊娠糖尿病，接受生理活動評估 (biophysical profile, BPP)：無壓力試驗 (non-stress test, NST) 測量結果為反應性 (R-NST)、胎兒 30 分鐘內有 1 次胎動、胎兒四肢張力弱、呼吸運動正常及羊水量正常。下列評估處置何者最適當？(以 0、2 計分法)
- (A) BPP：8 分，胎兒狀況良好
(B) BPP：8 分，可居家觀察，24 小時後再評估
(C) BPP：6 分，建議住院觀察，24 小時後再評估
(D) BPP：6 分，建議住院，安排生產
34. 足月待產之產程活動期，發生胎兒窘迫常見徵象，下列何者最適當？
- ① 胎兒活動減少
② 宮縮將結束時，胎心率開始減速
③ 羊水中有胎便染色
④ 胎心率變異性 6-10 bpm
- (A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①④
35. 根據美國婦產科學院 (American College of Obstetrics and Gynecology) 建議，對疑有子宮內膜異位症者進行首要的影像學檢查，下列何者最適當？
- (A) 經陰道超音波檢查 (B) 電腦斷層檢查
(C) 核磁共振檢查 (D) 子宮輸卵管攝影檢查
36. 相較於開腹手術 (laparotomy)，下列何者不是腹腔鏡手術的優點？
- (A) 住院時間較短 (shorter hospital stays)
(B) 手術後比較不會疼痛 (less postoperative pain)
(C) 較快恢復正常的活動 (faster return to normal activity)
(D) 手術室使用時間較短 (shorter operating room time)
37. 50 歲年齡層的婦女最常見的尿失禁 (urinary incontinence) 為下列何項？
- (A) 急迫性尿失禁 (urgency urinary incontinence)
(B) 混合型尿失禁 (mixed urinary incontinence)
(C) 應力性尿失禁 (stress urinary incontinence)
(D) 尿道外尿失禁 - 膀胱陰道瘻管 (extraurethral urinary incontinence - vesicovaginal fistula)
38. 55 歲婦女，陰道生產 4 次，10 年前因子宮肌瘤經血過多接受全子宮切除手術，最近 1 年有骨盆下墜感，偶有解尿不順、便秘及性交疼痛，此外一般健康狀況良好，理學檢查發現陰道頂端 (vaginal vault) 脫垂於陰道外，陰道長度只有 5 cm，病人期望接受手術後能夠有正常性生活。下列何者為首選的手術方式？
- (A) 薦骨坐骨棘韌帶懸吊術 (sacrospinous ligament fixation)
(B) 子宮薦骨韌帶懸吊術 (uterosacral ligament suspension)
(C) 陰道薦骨固定術 (sacrocolpopexy)
(D) 腸骨尾骨陰道固定術 (iliococcygeal vaginal suspension)
39. 下列何者不是續發性經痛 (secondary dysmenorrhea) 常見的原因？
- (A) 子宮肌腺症 (adenomyosis) (B) 子宮內膜異位症 (endometriosis)
(C) 子宮肌瘤 (uterine leiomyoma) (D) 子宮頸息肉 (cervical polyp)

40. 30歲婦女，過往月經週期約30-45天一次，最近一次月經在2個月前，下列何者診斷需優先考慮？
 (A) 骨盆腔發炎 (B) 子宮肌瘤 (C) 懷孕 (D) 子宮內膜異位症
41. 35歲婦女因肚子痛前來急診，合併陰道少量出血，生命徵象穩定，抽血 β -hCG 數值為 950 mIU/mL，陰道及腹部超音波檢查子宮內沒看到妊娠囊、無腹水及其他特別發現，下列何者處置最適當？
 (A) 腹腔鏡子宮外孕手術 (B) 肌肉注射 methotrexate
 (C) 靜脈注射 methotrexate (D) 48小時後追蹤 β -hCG 數值
42. 下列何項疫苗建議在孕期間施打？
 (A) 流感疫苗 (B) 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗
 (C) 水痘疫苗 (D) 人類乳突病毒疫苗
43. 下列何項營養品懷孕期間不建議補充？
 (A) 葉酸 (B) 鐵劑 (C) 鈣片 (D) 維生素 A
44. 下列何項病症不適合使用子宮鏡手術？
 (A) 15 cm 子宮肌瘤壓迫膀胱 (B) 經血過多
 (C) 30年前裝的避孕器無法取出 (D) 結紮手術
45. 下列何項卵巢囊腫最容易導致卵巢扭轉？
 (A) 子宮內膜異位瘤 (B) 畸胎瘤 (C) 黃體囊腫 (D) 黏液性囊腫
46. 一位婦女懷孕36週，主訴昨天清晨3點陰道斷斷續續地有水樣物排出，自行在家觀察1天後仍持續有此情形，今晨9點來就診，以試紙測試確認為破水，觀察其羊水清澈、胎心率为 124 bpm 和變異性為中等。後續評估處置，下列何者最適當？
 (A) 給予口服抗生素，返家待產 (B) 觀察評估有無感染徵象
 (C) 辦理入院立即安排剖腹生產 (D) 入院觀察72小時，若無感染可返家
47. 下列何者是胎盤早期剝離的婦女，較常出現的徵象？
 (A) 子宮底高度的測量值增加 (B) 無痛性陰道出血
 (C) 胎心率为 110-160 bpm (D) 發燒伴隨白血球增多症
48. 下列孕婦目前產檢皆正常，單胞胎，無抽菸喝酒習慣，何者最有可能是發生胎盤早期剝離的高危險群？
 (A) G2P1A0，懷孕27週 (B) G3P1AA1，17歲青少年
 (C) G4P3A0，癌症倖存者 (D) G4P1SA2，古柯鹼成癮者
49. 有關乙型鏈球菌檢測 (streptococcus agalactiae, GBS) 為陰性的婦女，發生產前破水 (prematurely ruptured membranes at term) 之相關處置，下列何者最適當？
 ① 先等待6-12小時，若沒有子宮收縮，再使用催產素刺激產程
 ② 立即進行催生可降低產時及產後的感染率
 ③ 居家等待產兆比直接入院觀察，有較佳的生產結果
 ④ 應立即住院施打預防性抗生素
 ⑤ 破水超過18小時才需要打抗生素
 (A) ①③⑤ (B) ②③④ (C) ②⑤ (D) ①④

50. 妊娠糖尿病於懷孕中、末期，受下列何項荷爾蒙之影響，會產生胰島素阻抗作用？
(A) 雌性素 (estrogen) (B) 黃體激素 (progesterone)
(C) 人類絨毛膜促性腺激素 (hCG) (D) 人類胎盤泌乳激素 (hPL)
51. 妊娠糖尿病婦女若孕期血糖控制不良，對母嬰容易發生下列哪些合併症？
① 妊娠高血壓 ② 巨嬰 ③ 羊水過少 ④ 新生兒低血糖 ⑤ 前置胎盤
(A) ①②③ (B) ②③④ (C) ③④⑤ (D) ①②④
52. 一位婦女妊娠 36 週診斷子癇前症住院，使用硫酸鎂 ($MgSO_4$) 治療後，發生呼吸抑制情形，此時檢驗其血中硫酸鎂濃度，下列何者最適當？
(A) 2-3 mg/dL (B) 4-8 mg/dL
(C) 9-10 mg/dL (D) 15-17 mg/dL
53. 一位婦女妊娠 35 週診斷重度子癇前症，入院接受硫酸鎂 ($MgSO_4$) 治療，當發生下列何種情況時建議停藥？
(A) 深部肌腱反射 (DTR) 1+ (B) 呼吸速率每分鐘 13-14 次/分
(C) 4 小時尿量少於 100 mL (D) 血壓值 160/110 mmHg
54. 下列何者不是產後出血第一時間立即需做的處置？
(A) 找出出血原因 (B) 按摩子宮
(C) 檢測血中 fibrinogen level (D) 靜脈點滴快速給予 oxytocin
55. 有關產後憂鬱 (postpartum depression) 的治療，下列何者不適當？
(A) 輕度產後憂鬱，優先考慮使用抗憂鬱症藥物
(B) 輕中度運動有益於改善產後憂鬱
(C) 中度產後憂鬱，使用抗憂鬱症藥物外加上心理治療 (psychotherapy)
(D) 重度產後憂鬱，藥物使用優先考慮 selective serotonin - reuptake inhibitor (SSRI) 治療
56. 下列何者發生雙胞胎輸血症候群 (twin-twin transfusion syndrome) 的機會最高？
(A) dichorionic diamniotic twins
(B) monozygotic twins
(C) monochorionic diamniotic twins
(D) monochorionic monoamniotic twins
57. 下列何者不是以內科藥物 (methotrexate) 治療子宮外孕之禁忌症？
(A) 輸卵管破裂 (B) 子宮內懷孕
(C) 餵母乳 (D) 另一側輸卵管異常
58. 有關產後憂鬱評估較常用的量表為下列何者？
(A) 匹茲堡量表 (B) 愛丁堡量表
(C) 愛普沃斯量表 (D) 紐卡索渥太華量表
59. 一位懷孕 8 週的婦女主述孕吐，下列何者治療處方不適當？
(A) pyridoxine (B) doxylamine
(C) ondansetron hydrochloride (D) pyrazinamide
60. 下列心血管藥物，何者最不適合在懷孕使用？
(A) hydralazine (B) digoxin (C) warfarin (D) methyl dopa

61. 下列何者不是子癩前症的危險因子？
(A) 多胞胎 (B) 肥胖
(C) 系統性紅斑性狼瘡 (D) 經產婦
62. 一位婦女被診斷患有第2型單純疱疹病毒，下列敘述何者正確？
(A) 如果沒有病灶出現，就不會感染給性伴侶
(B) 建議每年皆須做子宮頸抹片檢查
(C) 服用 acyclovir (Zovirax®) 2週，可清除潛伏的病毒
(D) 為避免新生兒感染，生產時必須採剖腹產
63. 在評估閉經但具有正常第二性徵的年輕婦女時，進行黃體素測試(progesterone challenge test) 的主要目的，是在確認下列何者足夠性？
(A) 泌乳素 (B) 甲狀腺素 (T4)
(C) 體內脂肪 (D) 內源性雌激素 (E2)
64. 有關婦女於門診治療骨盆腔炎後的門診追蹤建議，下列敘述何者最適當？
(A) 持續疼痛或發燒超過5天，再回診追蹤
(B) 若症狀未改善，應在治療後72小時內回診
(C) 治療2週後進行披衣菌及淋菌檢查
(D) 預約1週後回診施打第2劑 ceftriaxone IM
65. 子宮內膜異位症的最佳鑑別性診斷依據，下列何者最適當？
(A) CT scan (B) laparoscopy
(C) serum CA125 (D) abdominal ultrasound
66. 1年前治療原發性梅毒的婦女返診追蹤，實驗室檢查結果如下：VDRL non-reactive、fluorescent treponemal antibody absorbed test (FTA-ABS)(+)。此檢查結果，下列敘述何項最適當？
(A) 梅毒治療成效不彰
(B) 完成治療後又再度感染梅毒
(C) 可能有其他感染導致FTA-ABS呈現陽性
(D) 有適當的治療，沒有再度感染
67. 婦科癌症除了外科手術治療外，大部分仍須接受輔助治療，其中荷爾蒙(黃體素製劑)治療，可為下列何種婦癌治療的方式？
(A) 子宮頸癌 (B) 卵巢癌 (C) 子宮內膜癌 (D) 輸卵管癌
68. 有關放射治療應用於子宮頸癌病人，下列敘述何者不適當？
(A) 對不適合手術者或較晚期病人，放射治療為優先選擇
(B) 放射治療不可單獨作為於手術後的輔助治療
(C) 放射治療短期副作用有腹瀉、腹痛、頻尿等
(D) 晚期病人接受放射治療同時使用 cisplatin 化學治療可降低死亡率
69. 接受體腔內放射治療前，下列何項數值是可接受治療之主要指標？
(A) 白血球(WBC) 4000/ μ L (B) 血色素(Hb) 6g/dL
(C) 肌酸酐(creatinine) 0.45 mg/dL (D) AST 90 U/L

70. 子宮內膜癌手術後的輔助治療，下列敘述何者最適當？
(A) 術後接受放射治療可減少骨盆腔復發，亦可治療遠處轉移
(B) 第四期的子宮內膜癌，應先考慮化學治療
(C) 第四期的子宮內膜癌做放射治療者比做化學治療者存活時間增加
(D) 化療藥物單獨使用比合併多種藥物使用效果較好
71. 有關化學藥物治療的副作用中，對於心臟有明顯累積性毒性是哪一種化療藥物？
(A) doxorubicin (B) topotecan (C) carboplatin (D) cisplatin
72. 下列何者不是「Rotterdam criteria」診斷多囊性卵巢的條件？
(A) 卵巢功能失常 - 少排卵或不排卵 (oligoovulation or anovulation)
(B) 血糖過高 (hyperglycemia)
(C) 高男性荷爾蒙臨床表現 (clinical signs of hyperandrogenism)
(D) 卵巢有多囊型態 (PCO morphology)
73. 不孕婦女發現有一個 2 cm 之子宮黏膜下肌瘤，下列何者為較適當切除肌瘤的方式？
(A) 腹腔鏡子宮肌瘤切除術 (laparoscopic myomectomy)
(B) 子宮腔鏡子宮肌瘤切除術 (hysteroscopic myomectomy)
(C) 開腹子宮肌瘤切除術 (myomectomy)
(D) 機器手臂輔助腹腔鏡子宮肌瘤切除術 (robot assisted laparoscopic myomectomy)
74. 有關卵巢過度刺激症候群 (ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS) 之敘述，下列何者錯誤？
(A) 為刺激排卵藥物引起
(B) 致病機轉為卵泡的顆粒細胞 (granulosa cells) 分泌之大量血管內皮生長因子 (vascular endothelial growth factor, VEGF) 和其他發炎性細胞激素 (inflammatory cytokines) 一起促成
(C) 多囊性卵巢病人較不會發生
(D) 有胸腔積液 (hydrothorax) 或呼吸困難 (dyspnea) 之症狀，就屬於重度卵巢過度刺激症候群 (severe OHSS)
75. 有關子宮異常出血 (abnormal uterine bleeding)，國際婦產科醫學會 (FIGO) 建議以 PALM 縮寫詞 (acronym) 來描述其結構原因 (structural causes)，關於 PALM 之敘述，下列何者錯誤？
(A) P : polyp (B) A : adhesion
(C) L : leiomyoma (D) M : malignancy & hyperplasia
76. 濾泡發育 (follicular development) 的基本原則為兩細胞兩性腺激素理論 (two-cell, two-gonadotropin theory)，下列何者不是此兩細胞兩性腺激素？
(A) granulosa cell
(B) theca cell
(C) FSH (follicle-stimulating hormone)
(D) hCG (human chorionic gonadotropin)
77. 下列何者不是子宮內膜癌的危險因子？
(A) 足月生育過 (B) 肥胖
(C) 糖尿病 (D) 使用泰莫西芬 (tamoxifen)
78. 下列何者為子宮內膜癌最常見的細胞型態？
(A) clear cell carcinoma (B) mucinous carcinoma
(C) endometrioid carcinoma (D) serous carcinoma

79. 有關子宮頸癌治療方式之敘述，下列何者最適當？
- (A) stage IA 進行放射線治療
 - (B) stage IIA 進行子宮頸圓錐狀切除
 - (C) stage IIIC1 進行全子宮切除手術
 - (D) stage IVA 進行根除性全子宮切除手術
80. 卵巢癌使用化療藥物 carboplatin 治療，其劑量計算方式是採用下列何者？
- (A) area under the curve (AUC)
 - (B) per weight
 - (C) per body surface area (BSA)
 - (D) creatinine clearance rate (Ccr)

【以下空白】

公告試題
僅供參考